

# RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO CENTRO ESTADUAL DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO JUAREZ BARBOSA (CEMAC JB) INCLUÍDOS NO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF) E PADRONIZADOS NO ELENCO ESTADUAL

CEMAC JB  
Centro Estadual  
de Medicação  
de Alto Custo  
Juarez Barbosa

SES  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



## Tabela de Consulta por Medicamento - atualizada em **02/03/2026**



Siga os passos abaixo para verificar se o medicamento desejado está disponível de acordo com a sua doença/agravo.



- 1) Ache o medicamento (nome genérico) que deseja verificar a disponibilidade no SUS;
- 2) Confira se a doença/agravo e o CID-10 (classificação da doença) estão contemplados para o seu caso;

Clique no nome da doença/agravo para abrir a relação de documentos e exames necessários para abertura de processo;

Verifique no sítio eletrônico da CEMAC Juarez Barbosa como encaminhar os documentos e exames para a abertura de processo. O processo deverá ser aberto pela plataforma digital:

[\*\*PORTAL EXPRESSO\*\*](#)

Número de doenças/agravos (protocolos) contempladas:

**114**

Quantidade de medicamentos disponíveis:

**159**

Quantidade de apresentações farmacêuticas disponíveis:

**287**

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <i>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</i>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
01	1B	Ácido Ursodesoxicólico 50 mg	- <a href="#">Colangite Biliar Primária</a> (K74.3)	<b>K 74.3</b> — Cirrose biliar primária (Colangite destrutiva não supurativa crônica)
02	2	Ácido Zoledrônico 0,05 mg/mL (por frasco de 100 mL)	- <a href="#">Osteoporose MS/GO</a> - ( M80.0 – M80.1 – M80.2 – M80.3 M80.4 – M80.5 – M80.8 – M80.9 - M81.0 - M81.1 – M81.2 – M81.3 – M81.4 M81.5 – M81.6 – M81.8 – M81.9 - M82.0 - M82.1 – M82.8- M85.8- M88.0 – M88.8	<b>M 80.0</b> — Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica. <b>M 80.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica. <b>M 80.2</b> — Osteoporose de desuso com fratura patológica. <b>M 80.3</b> — Osteoporose por má absorção pós-cirúrgica com fratura patológica. <b>M 80.4</b> — Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica. <b>M 80.5</b> — Osteoporose idiopática com fratura patológica. <b>M 80.8</b> — Outras osteoporoses com fratura patológica. <b>M 80.9</b> — Osteoporose não especificada com fratura patológica <b>M 81.0</b> — Osteoporose pós-menopáusia. <b>M 81.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia. <b>M 81.2</b> — Osteoporose de desuso. <b>M 81.3</b> — Osteoporose devida à má absorção pós-cirúrgica. <b>M 81.4</b> — Osteoporose induzida por drogas. <b>M 81.5</b> — Osteoporose idiopática. <b>M 81.6</b> — Osteoporose localizada [Lequesne]. <b>M 81.8</b> — Outras osteoporoses. <b>M 81.9</b> — Osteoporose não especificada. <b>M 82.0</b> — Osteoporose na mielomatose múltipla. <b>M 82.1</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos. <b>M 82.8</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos. <b>M85.8</b> - Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura óssea <b>M88.0</b> - Doença de Paget do crânio <b>M88.8</b> - Doença de Paget de outros ossos.
03	1B	Acitretina 10 mg (por cápsula).	- <a href="#">Ictioses Hereditárias</a> . (Q80.0 – Q80.1 – Q80.2 – Q80.3 – Q80.8 – Q80.9)	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
03	1B	Acitretina 10 mg (por cápsula).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Outras malformações congênitas especificadas da pele.</a> (Q82.8)</li> <li>- <a href="#">Pitíriase Rubra Pilar.</a>(L44.0)</li> <li>- <a href="#">Psoríase.</a> (L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8)</li> </ul>	<p><b>L44.0</b> - Pitíriase rubra pilar  <b>Q80.0</b> - Ictiose vulgar  <b>Q80.1</b> - Ictiose ligada ao cromossomo x  <b>Q80.2</b> - Ictiose lamelar  <b>Q80.3</b> - Eritrodermia ictiosiforme bulhosa congênita  <b>Q80.8</b> - Outras ictioses congênicas  <b>Q80.9</b> – Ictiose congênita não especificada  <b>Q82.8</b> - Outras malformações congênicas especificadas da pele</p>
04	1B	Acitretina 25 mg (por cápsula).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Ictioses Hereditárias.</a> (Q80.0 – Q80.1 – Q80.2 – Q80.3 - Q80.8 – Q80.9)</li> <li>- <a href="#">Outras malformações congênitas especificadas da pele.</a> (Q82.8)</li> <li>- <a href="#">Pitíriase Rubra Pilar.</a>(L44.0)</li> <li>- <a href="#">Psoríase.</a> (L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8)</li> </ul>	<p><b>L40.0</b> - Psoríase vulgar  <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada  <b>L40.4</b> - Psoríase gutata  <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase  <b>L44.0</b> - Pitíriase rubra pilar  <b>Q80.0</b> - Ictiose vulgar  <b>Q80.1</b> - Ictiose ligada ao cromossomo x  <b>Q80.2</b> - Ictiose lamelar  <b>Q80.3</b> - Eritrodermia ictiosiforme bulhosa congênita  <b>Q80.8</b> - Outras ictioses congênicas  <b>Q80.9</b> – Ictiose congênita não especificada  <b>Q82.8</b> - Outras malformações congênicas especificadas da pele</p>
05	1A	Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Artrite Psorásica</a> (M07.0 – M07.2 - M07.3)</li> <li>- <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9:)</li> <li>- <a href="#">Doença de Crohn.</a> (K50.0 – K50.1 – K50.8) - <b>SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 06 ANOS DE IDADE</b></li> <li>- <a href="#">Espondilite Ancilosante.</a> (M45)</li> <li>- <a href="#">Espondilite Inflamatória</a> (M46.8)</li> <li>- <a href="#">Hidradenite Supurativa</a> (L73.2) – <b>SOMENTE PARA PACIENTES</b></li> </ul>	<p><b>H15.0</b> — Esclerite  <b>H20.1</b> — Iridociclite crônica  <b>H30.1</b> — Inflamação coriorretiniana disseminada  <b>H30.2</b> — Ciclite posterior  <b>H30.8</b> — Outras inflamações coriorretinianas  <b>K50.0</b> - Doença de Crohn do intestino delgado  <b>K50.1</b> - Doença de Crohn do intestino grosso  <b>K50.8</b> – Outra forma de Doença de Crohn  <b>L40.0</b> - Psoríase vulgar  <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada  <b>L40.4</b> - Psoríase gutata  <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase  <b>L73.2</b> – Hidradenite Supurativa</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
05	1A	Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida).	<p><b>≥ 18 ANOS DE IDADE</b></p> <p>- <u>Psoríase.</u> (L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8) - <b>SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE</b></p> <p>- <u>Uveítes Não Infecciosas.</u> (H15.0; H20.1; H30.1; H30.2; H30.8) - <b>SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE</b></p>	<p><b>M05.0</b> - Síndrome de Felty  <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão  <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide  <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas  <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas  <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa  <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas  <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal  <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica  <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas  <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil  <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil  <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico  <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil  <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular  <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis  <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE  <b>M45</b> - Espondilite ancilosante  <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas</p>
06	1A	Adalimumabe 40 mg injetável (frasco ampola). <b>SOMENTE PARA PACIENTES ≤ 18 ANOS DE IDADE</b>	<p>- <u>Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</u> (M08.0 – M08.1 – M08.2 – M08.3 – M08.4 – M08.8 – M08.9)  - <u>Doença de Crohn.</u> (K50.0 – K50.1 – K50.8)  - <u>Espondilite Ancilosante.</u> (M45)  - <u>Espondilite Inflamatória</u> (M46.8)</p>	<p><b>K50.0</b> - Doença de Crohn do intestino delgado  <b>K50.1</b> - Doença de Crohn do intestino grosso  <b>K50.8</b> – Outra forma de Doença de Crohn  <b>M08.0</b> - Artrite reumatoide juvenil  <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil  <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico  <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil  <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular  <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis  <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE  <b>M45</b> - Espondilite ancilosante  <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
07	Protocolo Estadual (RECOME)	Aflibercepte 40 mg/mL solução injetável (frasco-ampola)	<p>- <a href="#">Edema Macular secundário à retinopatia diabética (EMD)</a> (EMD) (H36.0)</p> <p>- <a href="#">Edema Macular secundário à Oclusão Venosa da Retina (OVR)</a> (OVR) (H34.8)</p> <p>- <a href="#">Degeneração Macular relacionada à Idade (DMRI) Neovascular</a> (H35.3)</p> <p><b>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás)</b>  O acesso a estes medicamentos está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</p> <p><b>Atenção:</b> Verificar nas Portarias Estaduais nº 03/2019-SES; nº 04/2019-SES, nº05/2019-SES e nº 2101/2021-SES como se dá o acesso e o fluxo de aplicação deste medicamento.</p>	<p><b>H 36.0</b> – Retinopatia Diabética</p> <p><b>H 34.8</b> – Outras oclusões vasculares retinianas</p> <p><b>H 35.3</b> – Degeneração da mácula e do polo posterior</p>
08	1A	Alemtuzumabe 10mg/mL solução injetável (frasco ampola com 1,2 mL)	- <a href="#">Esclerose Múltipla</a> . (G35)	<b>G35</b> - Esclerose múltipla
09	1A	Alfadornase 2,5 mg (por ampola).	- <a href="#">Fibrose Cística</a> . ( <a href="#">Manifestações Pulmonares e Insuficiência Pancreática</a> ) (E84.0 – E84.8)	<b>E84.0</b> - Fibrose cística com manifestações pulmonares <b>E84.8</b> - Fibrose cística com outras manifestações
10	1A	Alfaelossulfase 1mg/mL solução injetável (por frasco ampola de 5 mL)	- <a href="#">Outras Mucopolissacaridoses - Mucopolissacaridose Tipo IV A</a> (Síndrome de Morquio A)	<b>E76.2</b> – Outras mucopolissacaridoses

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	<b>DOENÇA/AGRAVO</b> <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	<b>DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)</b>
11	1A	Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Doença Renal Crônica - Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo e Estratégias de Atenuação</a> (N18.0 – N18.8)</li> <li>- <a href="#">Síndrome Mielodisplásica de baixo risco</a> (D46.0 – D46.1 – D46.4– D46.7)</li> <li>- <a href="#">Transplante de Medula ou Pâncreas</a>. (Z94.8)</li> </ul>	<b>D46.0</b> - Anemia refratária sem sideroblastos <b>D46.1</b> - Anemia refratária com sideroblastos <b>D46.4</b> – Anemia refratária não especificada <b>D46.7</b> - Outras síndromes mielodisplásicas <b>N18.0</b> - Doença renal em estágio final  <b>N18.8</b> - Outra insuficiência renal crônica <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados
12	1A	Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Doença Renal Crônica - Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo e Estratégias de Atenuação</a> (N18.0 – N18.8)</li> <li>-- <a href="#">Transplante de Medula ou Pâncreas</a>. (Z94.8)</li> </ul>	<b>N18.0</b> - Doença renal em estágio final <b>N18.8</b> - Outra insuficiência renal crônica <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados
13	1A	Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Doença Renal Crônica - Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo e Estratégias de Atenuação</a> (N18.0 – N18.8)</li> <li>- <a href="#">Transplante de Medula ou Pâncreas</a>. (Z94.8)</li> </ul>	<b>N18.0</b> - Doença renal em estágio final <b>N18.8</b> - Outra insuficiência renal crônica <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados
14	1A	Alfa-Alglicosidade 50 mg solução injetável (por frasco ampola)	- <a href="#">Doença de Pompe</a> (E74.0)	<b>E 74.0</b> - Doença de depósito de glicogênio
15	1B	Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola).	- <a href="#">Hemangioma</a> . (D18.0)	<b>D18.0</b> - Hemangioma de qualquer localização
16	1B	Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-ampola).	- <a href="#">Hemangioma</a> . (D18.0)	<b>D18.0</b> - Hemangioma de qualquer localização
17	1A	Alfataliglicerase 200 U injetável (por frasco ampola)	- <a href="#">Doença de Fabry e Doença de Gaucher</a> (E75.2)	<b>E75.2</b> - Outras esfingolipidoses
18	1A	Alfavelaglicerase 200 U injetável (por frasco ampola)	- <a href="#">Doença de Fabry e Doença de Gaucher</a> (E75.2)	<b>E75.2</b> - Outras esfingolipidoses
19	1A	Alfavelaglicerase 400 U injetável (por frasco ampola)	- <a href="#">Doença de Fabry e Doença de Gaucher</a> (E75.2)	<b>E75.2</b> - Outras esfingolipidoses

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO	
			<a href="#">Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo</a>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
20	1A	Alfavestronidase 2mg/mL solução injetável (frasco ampola de 5mL)	- <a href="#">Outras Mucopolissacaridoses - Mucopolissacaridose tipo VII</a> (Síndrome de Sly)	<b>E76.2</b> – Outras Mucopolissacaridoses
21	1B	Amantadina 100 mg (por comprimido).	- <a href="#">Doença de Parkinson.</a> (G20)	<b>G20</b> – Doença de Parkinson
22	1B	Ambrisentana 5 mg (por comprimido revestido).	- <a href="#">Hipertensão Arterial Pulmonar.</a> (I27.0 – I27.2 – I27.8)	<b>I27.0</b> - Hipertensão pulmonar primária <b>I27.2</b> - Outra hipertensão pulmonar secundária <b>I27.8</b> - Outras doenças pulmonares do coração especificadas
23	1B	Ambrisentana 10 mg (por comprimido revestido)	- <a href="#">Hipertensão Arterial Pulmonar.</a> (I27.0 – I27.2 – I27.8)	<b>I27.0</b> - Hipertensão pulmonar primária <b>I27.2</b> - Outra hipertensão pulmonar secundária <b>I27.8</b> - Outras doenças pulmonares do coração especificadas
24	2	Atorvastatina 10 mg (por comprimido).	- <a href="#">Dislipidemia.</a> (E78.0 – E78.1 – E78.2 – E78.3 E78.4 – E78.5 – E78.6 – E78.8)	<b>E78.0</b> - Hipercolesterolemia pura <b>E78.1</b> - Hipertrigliceridemia pura <b>E78.2</b> - Hiperlipidemia mista <b>E78.3</b> - Hiperquilomicronemia <b>E78.4</b> - Outras hiperlipidemias <b>E78.5</b> - Hiperlipidemia não especificada <b>E78.6</b> - Deficiências de lipoproteínas <b>E78.8</b> - Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas
25	2	Atorvastatina 20 mg (por comprimido).	- <a href="#">Dislipidemia.</a> (E78.0 – E78.1 – E78.2 – E78.3 E78.4 – E78.5 – E78.6 – E78.8)	<b>E78.0</b> - Hipercolesterolemia pura <b>E78.1</b> - Hipertrigliceridemia pura <b>E78.2</b> - Hiperlipidemia mista <b>E78.3</b> - Hiperquilomicronemia <b>E78.4</b> - Outras hiperlipidemias <b>E78.5</b> - Hiperlipidemia não especificada <b>E78.6</b> - Deficiências de lipoproteínas <b>E78.8</b> - Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO - <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
26	2	Azatioprina 50 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 - M05.1 – M05.2 – M05.3 – M05.8 – M06.0 – M06.8 - M08.0)</li> <li>- <a href="#">Dermatomiosite e Polimiosite</a>. (M33.0 – M33.1 – M33.2)</li> <li>- <a href="#">Doença de Crohn</a>. (K50.0 – K50.1 – K50.8)</li> <li>- <a href="#">Esclerose Múltipla</a>. (G35)</li> <li>- <a href="#">Esclerose Sistêmica</a>. (M34.0 – M34.1 – M34.8)</li> <li>- <a href="#">Hepatite Autoimune</a>. (K75.4)</li> <li>- <a href="#">Lupus Eritematoso Sistêmico</a> (L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8)</li> <li>- <a href="#">Miastenia Gravis</a> (G70.0 – G70.2)</li> <li>- <a href="#">Púrpura Trombocitopênica Idiopática</a>. (D69.3)</li> <li>- <a href="#">Retocolite Ulcerativa</a>. (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 – K51.5 – K51.8)</li> <li>- <a href="#">Transplante Cardíaco</a>. (Z94.1)</li> <li>- <a href="#">Transplante de Coração e Pulmão</a> (Z94.3)</li> <li>- <a href="#">Transplante de Medula ou Pâncreas</a>. (Z94.8)</li> <li>- <a href="#">Transplante de Pulmão</a>. (Z94.2)</li> <li>- <a href="#">Transplante Hepático</a>. (T86.4 – Z94.4)</li> <li>- <a href="#">Transplante Renal</a> (T86.1 – Z94.0)</li> <li>- <a href="#">Uveítes Não Infecciosas</a>. (H15.0 – H20.1 – H30.1 – H30.2 – H30.8)</li> </ul>	<p><b>D61.0</b> - Anemia aplástica constitucional  <b>D69.3</b> - Púrpura trombocitopênica idiopática  <b>G35</b> - Esclerose múltipla  <b>G70.0</b> - Miastenia gravis  <b>G70.2</b> - Miastenia congênita e do desenvolvimento  <b>H15.0</b> — Esclerite  <b>H20.1</b> — Iridociclite crônica  <b>H30.1</b> - Inflamação coriorretiniana disseminada  <b>H30.2</b> - Ciclite posterior  <b>H30.8</b> - Outras inflamações coriorretinianas  <b>K50.0</b> - Doença de crohn do intestino delgado  <b>K50.1</b> - Doença de crohn do intestino grosso  <b>K50.8</b> - Outra forma de doença de crohn  <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica)  <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica)  <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica)  <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica)  <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon  <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa  <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas  <b>K75.4</b> - Hepatite autoimune  <b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide  <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo  <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty  <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão  <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide  <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas  <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas  <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa  <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas  <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil  <b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas  <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]  <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil  <b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites  <b>M33.2</b> - Polimiosite  <b>M34.0</b> - Esclerose sistêmica progressiva  <b>M34.1</b> - Síndrome cr(e)st  <b>M34.8</b> - Outras formas de esclerose sistêmica</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
26	2	Azatioprina 50 mg (por comprimido).		<b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração. <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.2</b> - Pulmão transplantado <b>Z94.3</b> - Coração e pulmões transplantados <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados
30	1A	Baricitinibe 2 mg	– <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.1 – M05.2- M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8)	<b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas
31	1A	Baricitinibe 4 mg	– <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.1 – M05.2- M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8)	<b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
----	-------	--------------	---	---

32	1A	Betainterferona 1a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (por seringa preenchida).	- <a href="#">Esclerose Múltipla.</a> (G35)	<b>G35</b> – Esclerose múltipla
33	1A	Betainterferona 1a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (por frasco ampola ou caneta preenchida ou seringa preenchida)	- <a href="#">Esclerose Múltipla.</a> (G35)	<b>G35</b> – Esclerose múltipla
34	1A	Betainterferona 1a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida).	- <a href="#">Esclerose Múltipla.</a> (G35)	<b>G35</b> – Esclerose múltipla
35	1A	Betainterferona 1b 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (por frasco-ampola).	- <a href="#">Esclerose Múltipla.</a> (G35)	<b>G35</b> – Esclerose múltipla
36	2	Bezafibrato 200 mg (por drágea ou comprimido).	- <a href="#">Dislipidemia.</a> (E78.0 – E78.1 – E78.2 – E78.3 E78.4 – E78.5 – E78.6 – E78.8)	<b>E78.0</b> - Hipercolesterolemia pura <b>E78.1</b> - Hipergliceridemia pura <b>E78.2</b> - Hiperlipidemia mista <b>E78.3</b> - Hiperquilomicronemia <b>E78.4</b> - Outras hiperlipidemias <b>E78.5</b> - Hiperlipidemia não especificada <b>E78.6</b> - Deficiências de lipoproteínas <b>E78.8</b> - Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas
37	1A	Bimatoprost 0,3 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 3 ml).	- <a href="#">Glaucoma.</a> (H40.1 – H40.2 – H40.3 – H40.4 H40.5 – H40.6 – H40.8 – Q15.0)	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <a href="#">Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo</a>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
----	-------	--------------	---	---

38	1A	Biotina 2,5 mg (por cápsula)	- <a href="#">Deficiência de Biotinidase</a> (DB) ( E88.9)	<b>E88.9</b> – Distúrbio metabólico não especificado
39	1B	Bosentana 62,5 mg (por comprimido revestido).	- <a href="#">Hipertensão Arterial Pulmonar.</a> (I27.0 – I27.2 – I27.8)	<b>I27.0</b> - Hipertensão pulmonar primária <b>I27.2</b> - Outra hipertensão pulmonar secundária <b>I27.8</b> - Outras doenças pulmonares do coração especificadas
40	1B	Bosentana 125 mg (por comprimido revestido)	- <a href="#">Hipertensão Arterial Pulmonar.</a> (I27.0 – I27.2 – I27.8)	<b>I27.0</b> - Hipertensão pulmonar primária <b>I27.2</b> - Outra hipertensão pulmonar secundária <b>I27.8</b> - Outras doenças pulmonares do coração especificadas
41	2	Brimonidina 2,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml).	- <a href="#">Glaucoma.</a> (H40.1 – H40.2 – H40.3 – H40.4 H40.5 – H40.6 – H40.8 – Q15.0)	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito
42	2	Brinzolamida 10 mg/ml suspensão oftálmica (por frasco de 5 ml).	- <a href="#">Glaucoma.</a> (H40.1 – H40.2 – H40.3 – H40.4 H40.5 – H40.6 – H40.8 – Q15.0)	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito
43	1B	Brometo de Glicopirrônio 12,5 mcg + Formoterol 6mcg + Beclometasona 100 mcg (solução para inalação oral)	- <a href="#">Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO</a> (J44.0 – J44.1 – J44.8)	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
44	1B	Brometo de tiotrópio 2,5 mcg + Olodaterol 2,5 mcg (solução para inalação oral)	- <a href="#">Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO</a> (J44.0 – J44.1 – J44.8)	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
45	Protocolo Estadual (RECOME)	Brometo de Umeclidínio 62,5 mcg (pó inalatório)	- <a href="#">Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO</a> (J44.0 – J44.1 – J44.8) <b>O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</b>	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
46	1B	Brometo de Umeclidínio 62,5 mcg + Vilanterol 25mcg (pó inalante)	- <a href="#">Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO</a> (J44.0 – J44.1 – J44.8)	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
47	1B	Brometo de Umeclidínio 62,5 mcg + Vilanterol 25mcg + Fluticasona 100 mcg (pó para inalação)	- <a href="#">Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO</a> (J44.0 – J44.1 – J44.8)	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica
48	2	Budesonida 400 mcg (por capsula inalante).	- <a href="#">Asma</a> (J45.0 – J45.1 – J45.8) - <a href="#">Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO</a> (J44.0 – J44.1 – J44.8)	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica <b>J45.0</b> - Asma predominantemente alérgica <b>J45.1</b> - Asma não-alérgica <b>J45.8</b> - Asma mista
49	1A	Burosumabe solução injetável 10 mg/mL	- <a href="#">Raquitismo e Osteomalácia</a> (E55.0 – E55.9 – E64.3 – E83.3 M83.0 – M83.1 – M83.2 – M83.3 M83.8)	<b>E55.0</b> - Raquitismo ativo <b>E55.9</b> - Deficiência não especificada de vitamina D <b>E64.3</b> - Sequelas do raquitismo <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo <b>E55.0</b> - Raquitismo ativo

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
	1A	Burosumabe solução injetável 10 mg/mL		E55.9 - Deficiência não especificada de vitamina D E64.3 - Sequelas do raquitismo E83.3 - Distúrbios do metabolismo do fósforo
50	1A	Burosumabe solução injetável 20 mg/mL	- <a href="#">Raquitismo e Osteomalácia</a> (E55.0 – E55.9 – E64.3 – E83.3 M83.0 – M83.1 – M83.2 –M83.3 M83.8)	E55.0 - Raquitismo ativo E55.9 - Deficiência não especificada de vitamina D E64.3 - Sequelas do raquitismo E83.3 - Distúrbios do metabolismo do fósforo E55.0 - Raquitismo ativo E55.9 - Deficiência não especificada de vitamina D E64.3 - Sequelas do raquitismo E83.3 - Distúrbios do metabolismo do fósforo
51	1A	Burosumabe solução injetável 30 mg/mL	- <a href="#">Raquitismo e Osteomalácia</a> (E55.0 – E55.9 – E64.3 – E83.3 M83.0 – M83.1 – M83.2 –M83.3 M83.8)	E55.0 - Raquitismo ativo E55.9 - Deficiência não especificada de vitamina D E64.3 - Sequelas do raquitismo E83.3 - Distúrbios do metabolismo do fósforo E55.0 - Raquitismo ativo E55.9 - Deficiência não especificada de vitamina D E64.3 - Sequelas do raquitismo E83.3 - Distúrbios do metabolismo do fósforo
52	1A	Cabergolina 0,5 mg (por comprimido).	- <a href="#">Acromegalia</a> (E22.0) - <a href="#">Hiperprolactinemia</a> . (E22.1)	E22.0 - Acromegalia e gigantismo hipofisário E22.1 - Hiperprolactinemia
53	2	Calcipotriol 50 mcg/g pomada (por bisnaga de 30g).	- <a href="#">Psoríase</a> . (L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8)	L40.0 - Psoríase vulgar L40.1 - Psoríase pustulosa generalizada L40.4 - Psoríase gutata L40.8 - Outras formas de psoríase
54	2	Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco).	- <a href="#">Doença de Paget - Osteíte deformante</a> (M88.0 – M88.8) - <a href="#">Osteoporose MS/GO</a> – ( M80.0 – M80.1 – M80.2 – M80.3 M80.4 – M80.5 – M80.8 – M80.9 - M81.0 - M81.1 – M81.2 – M81.3 – M81.4	M80.0 - Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica M80.1 - Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica M80.2 - Osteoporose de desuso com fratura patológica M80.3 - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
55	2	Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco).	M81.5 – M81.6 – M81.8 – M81.9 - M82.0 - M82.1 – M82.8 – M85.8)	<b>M80.4</b> - Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica <b>M80.5</b> - Osteoporose idiopática com fratura patológica <b>M80.8</b> - Outras osteoporoses com fratura patológica <b>M81.0</b> - Osteoporose pós-menopáusicas <b>M81.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia <b>M81.2</b> - Osteoporose de desuso <b>M81.3</b> - Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica <b>M81.4</b> - Osteoporose induzida por drogas <b>M81.5</b> - Osteoporose idiopática <b>M81.6</b> - Osteoporose localizada [Lequesne] <b>M81.8</b> - Outras osteoporoses <b>M82.0</b> - Osteoporose na mielomatose múltipla <b>M82.1</b> - Osteoporose em distúrbios endócrinos <b>M82.8</b> - Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte <b>M85.8</b> - Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura óssea <b>M88.0</b> - Doença de paget do crânio <b>M88.8</b> - Doença de paget de outros ossos
56	2	Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula).  <i>O calcitriol é o metabólito ativo do Alfacalcidol.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Doença Renal Crônica - Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo e Estratégias de Atenuação</a> (N18.2 – N18.3 – N18.4 – N18.5 – N25.0 – E83.3)</li> <li>- <a href="#">Hipoparatiroidismo</a>. (E20.0 – E20.1 – E20.8 – E89.2)</li> <li>- <a href="#">Osteoporose MS/GO</a> – ( M80.0 – M80.1 – M80.2 – M80.3 M80.4 – M80.5 – M80.8 – M80.9 - M81.0 - M81.1 – M81.2 – M81.3 – M81.4 M81.5 – M81.6 – M81.8 – M81.9 - M82.0 - M82.1 – M82.8 – M85.8)</li> <li>- <a href="#">Raquitismo e Osteomalácia</a>. (E55.0 – E55.9 – E64.3 – E83.3 - M83.0 – M83.1 – M83.2 –M83.3 M83.8)</li> </ul>	<b>E20.0</b> - Hipoparatiroidismo idiopático <b>E20.1</b> - Pseudohipoparatiroidismo <b>E20.8</b> - Outro hipoparatiroidismo <b>E55.0</b> - Raquitismo ativo <b>E55.9</b> - Deficiência não especificada de vitamina D <b>E64.3</b> - Seqüelas do raquitismo <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo <b>E89.2</b> - Hipoparatiroidismo pós-procedimento <b>M80.0</b> - Osteoporose pós-menopáusicas com fratura patológica <b>M80.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica <b>M80.2</b> - Osteoporose de desuso com fratura patológica <b>M80.3</b> - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica <b>M80.4</b> - Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica <b>M80.5</b> - Osteoporose idiopática com fratura patológica

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <a href="#">Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo</a>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
57	2	<p>Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula). O calcitriol é o metabólito ativo do Alfacalcidol.</p>		<p><b>M80.8</b> - Outras osteoporoses com fratura patológica  <b>M81.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia  <b>M81.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia  <b>M81.2</b> - Osteoporose de desuso  <b>M81.3</b> - Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica  <b>M81.4</b> - Osteoporose induzida por drogas  <b>M81.5</b> - Osteoporose idiopática  <b>M81.6</b> - Osteoporose localizada [Lequesne]  <b>M81.8</b> - Outras osteoporoses  <b>M82.0</b> - Osteoporose na mielomatose múltipla  <b>M82.1</b> - Osteoporose em distúrbios endócrinos  <b>M82.8</b> - Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte  <b>M85.8</b> - Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura óssea  <b>E55.0</b> - Raquitismo ativo  <b>E55.9</b> - Deficiência não especificada de vitamina D  <b>E64.3</b> - Seqüelas do raquitismo  <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo  <b>N18.2</b> – Doença renal crônico estágio 2 (suave)  <b>N18.3</b> – Doença renal crônico estágio 3 (moderado)  <b>N18.4</b> – Doença renal crônico estágio 4 (severo)  <b>N18.5</b> – Doença renal crônico estágio 5 (dialise crônica)  <b>N25.0</b> - Osteodistrofia renal</p>
58	2	<p>Calcitriol 1,0 mcg injetável (por ampola). O calcitriol é o metabólito ativo do Alfacalcidol.</p> <p><b>Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica (notificação feita na ANVISA/MS em 24/06/2019).</b></p>	<p>- <a href="#">Doença Renal Crônica - Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo e Estratégias de Atenuação</a> (N18.0 – N25.0 – E83.3)</p>	<p><b>18.0</b> - Doença renal em estágio final  <b>N25.0</b> - Osteodistrofia renal</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
59	1A	Certolizumabe pegol 200 mg/mL injetável (por seringa preenchida).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Artrite Psoríase</a> (M07.0 – M07.2 - M07.3)</li> <li>- <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.1 – M05.2- M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8)</li> <li>- <a href="#">Doença de Crohn</a>.K50.0 – K50.1 – K50.8)</li> <li>- <a href="#">Espondilite Ancilosante</a>. (M45)</li> <li>- <a href="#">Espondilopatia Inflamatória</a>. (M46.8)</li> </ul>	<p><b>M05.0</b> - Síndrome de Felty  <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão  <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide  <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas  <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas  <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa  <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas  <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal  <b>M07.2</b> - Espondilite Psoriásica  <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas  <b>M45</b> - Espondilite ancilosante  <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas  <b>K50.0</b> - Doença de Crohn do intestino delgado  <b>K50.1</b> - Doença de Crohn do intestino grosso  <b>K50.8</b> – Outra forma de Doença de Crohn</p>
60	2	Ciclofosfamida 50 mg (por drágea).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Anemia Hemolítica Autoimune</a> (D59.0 – D59.1)</li> <li>- <a href="#">Esclerose Sistêmica</a>. (M34.0 – M34.1 – M34.8)</li> <li>- <a href="#">Lupus Eritematoso Sistêmico</a> (L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8)</li> <li>- <a href="#">Púrpura Trombocitopênica Idiopática</a>. ( D69.3)</li> <li>- <a href="#">Síndrome Nefrótica Primária (Adulto e Infantil)</a> ((N04.0 – N04.1 – N04.2 – N04.3 N04.4 – N04.5 – N04.6 – N04.7 N04.8 – N04.9)</li> <li>- <a href="#">Síndrome da Falência Medular</a> (D60.0 – D60.1 – D60.8)</li> </ul>	<p><b>D59.0</b> - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga  <b>D59.1</b> - Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes  <b>D60.0</b> - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha  <b>D60.1</b> - Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória  <b>D60.8</b> – Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha  <b>D69.3</b> - Púrpura trombocitopênica idiopática  <b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide  <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo  <b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas  <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]  <b>M34.0</b> - Esclerose sistêmica progressiva  <b>M34.1</b> - Síndrome cr(e)st  <b>M34.8</b> - Outras formas de esclerose sistêmica  <b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular menor</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
61	2	Ciclofosfamida 50 mg (por drágea).		<p><b>N04.1</b> - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares  <b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa  <b>N04.3</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa  <b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa  <b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa  <b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso  <b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente  <b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica – outras  <b>N04.9</b> – Síndrome nefrótica – não especificada</p>
62	2	Ciclosporina 25 mg (por cápsula).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Anemia Hemolítica Autoimune</a> (D59.0 – D59.1)</li> <li>- <a href="#">Artrite Psoríase</a> (M07.0 – M07.2 - M07.3)</li> <li>- <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9)</li> <li>- <a href="#">Dermatite Atópica</a> (L20.0 – L20.8)</li> <li>- <a href="#">Dermatomiosite e Polimiosite</a>. (M33.0 – M33.1 – M33.2)</li> <li>- <a href="#">Lupus Eritematoso Sistêmico</a> (L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8)</li> <li>- <a href="#">Miastenia Gravis</a> (G70.0 – G70.2)</li> <li>- <a href="#">Psoríase</a>. (L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8)</li> <li>- <a href="#">Retocolite Ulcerativa</a>. (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 - K51.5 – K51.8)</li> <li>- <a href="#">Síndrome da Falência Medular</a> (D60.0 – D60.1 – D60.8 – D61.0 – D61.1 – D61.2 – D61.3 – D61.8 – Z94.8)</li> </ul>	<p><b>D59.0</b> - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga  <b>D59.1</b> - Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes  <b>D60.0</b> - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha  <b>D60.1</b> - Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória  <b>D60.8</b> - Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha  <b>D61.0</b> - Anemia Aplástica Constitucional.  <b>D61.1</b> - Anemia Aplástica Induzida por Drogas.  <b>D61.2</b> - Anemia Aplástica Devida a Outros Agentes Externos.  <b>D61.3</b> - Anemia Aplástica Idiopática.  <b>D61.8</b> - Outras Anemias Aplásticas Especificadas.  <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados  <b>G70.0</b> - Miastenia gravis  <b>G70.2</b> - Miastenia congênita e do desenvolvimento  <b>H20.1</b> - Iridociclite crônica  <b>H15.0</b> - Esclerite  <b>H30.1</b> - Inflamação coriorretiniana disseminada  <b>H30.2</b> - Ciclite posterior  <b>H30.8</b> - Outras inflamações coriorretinianas  <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica)  <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica)  <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica)</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
63	2	Ciclosporina 25 mg (por cápsula).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Síndrome Nefrótica Primária (Adulto e Infantil)</a> (N04.0 – N04.1 – N04.2 – N04.3 N04.4 – N04.5 – N04.6 – N04.7 N04.8 – N04.9)</li> <li>- <a href="#">Transplante Cardíaco</a>. (Z94.1 – T86.2)</li> <li>- <a href="#">Transplante de Coração e Pulmão</a> (Z94.3)</li> <li>- <a href="#">Transplante de Medula ou Pâncreas</a>. (Z94.8)</li> <li>- <a href="#">Transplante de Pulmão</a>. (Z94.2)</li> <li>- <a href="#">Transplante Hepático</a>. (T86.4 – Z94.4)</li> <li>- <a href="#">Transplante Renal</a>. (T86.1 – Z94.0)</li> <li>- <a href="#">Uveítes Não Infecciosas</a>. (H15.0 – H20.1 – H30.1 – H30.2 – H30.8)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica)</li> <li><b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon</li> <li><b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa</li> <li><b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas</li> <li><b>L20.0</b> – Prurido de Besnier</li> <li><b>L20.8</b> – Outras dermatites atópicas</li> <li><b>L40.0</b> - Psoríase vulgar</li> <li><b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada</li> <li><b>L40.4</b> - Psoríase gutata</li> <li><b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase</li> <li><b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide</li> <li><b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo</li> <li><b>M05.0</b> - Síndrome de Felty</li> <li><b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão</li> <li><b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide</li> <li><b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas</li> <li><b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas</li> <li><b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa</li> <li><b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas</li> <li><b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal</li> <li><b>M07.2</b> - Espondilite Psoriásica</li> <li><b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas</li> <li><b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil</li> <li><b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil</li> <li><b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico</li> <li><b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil</li> <li><b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular</li> <li><b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis</li> <li><b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE</li> <li><b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas</li> <li><b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]</li> </ul>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
64	2	Ciclosporina 25 mg (por cápsula).		<b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil <b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites <b>M33.2</b> - Polimiosite <b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor <b>N04.1</b> - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares <b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa <b>N04.3</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa <b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa <b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa <b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso <b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente <b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica – outras <b>N04.9</b> – Síndrome nefrótica – não especificada <b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.2</b> - Pulmão transplantado <b>Z94.3</b> - Coração e pulmões transplantados <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados
65	2	Ciclosporina 50 mg (por cápsula).	- <a href="#">Anemia Hemolítica Autoimune</a> (D59.0 – D59.1) - <a href="#">Artrite Psorásica</a> (M07.0 – M07.2 - M07.3) - <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9) - <a href="#">Dermatite Atópica</a> (L20.0 – L20.8)	<b>D59.0</b> - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga <b>D59.1</b> - Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes <b>D60.0</b> - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha <b>D60.1</b> - Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória <b>D60.8</b> – Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha <b>D61.0</b> — Anemia Aplástica Constitucional. <b>D61.1</b> — Anemia Aplástica Induzida por Drogas. <b>D61.2</b> — Anemia Aplástica Devida a Outros Agentes Externos. <b>D 61.3</b> — Anemia Aplástica Idiopática.

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
66	2	Ciclosporina 50 mg (por cápsula).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Dermatomiosite e Polimiosite.</a> (M33.0 – M33.1 – M33.2)</li> <li>- <a href="#">Lupus Eritematoso Sistêmico</a> (L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8)</li> <li>- <a href="#">Miastenia Gravis.</a> (G70.0-G70.2)</li> <li>- <a href="#">Psoríase.</a> (L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8)</li> <li>- <a href="#">Retocolite Ulcerativa.</a> (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 - K51.5 – K51.8)</li> <li>- <a href="#">Síndrome da Falência Medular</a> (D60.0 – D60.1 – D60.8 – D61.0 – D61.1 – D61.2 – D61.3 – D61.8 – Z94.8)</li> <li>- <a href="#">Síndrome Nefrótica Primária (Adulto e Infantil)</a> (N04.0 – N04.1 – N04.2 – N04.3 N04.4 – N04.5 – N04.6 – N04.7 N04.8 – N04.9)</li> <li>- <a href="#">Transplante Cardíaco.</a> (Z94.1 – T86.2)</li> <li>- <a href="#">Transplante de Coração e Pulmão</a> (Z94.3)</li> <li>- <a href="#">Transplante de Medula ou Pâncreas.</a> (Z94.8)</li> <li>- <a href="#">Transplante de Pulmão.</a> (Z94.2)</li> <li>- <a href="#">Transplante Hepático.</a> (T86.4 – Z94.4)</li> <li>- <a href="#">Transplante Renal</a> (T86.1 – Z94.0)</li> <li>- <a href="#">Uveítes Não Infecciosas.</a> (H15.0 – H20.1 – H30.1 – H30.2 – H30.8)</li> </ul>	<p><b>D 61.8</b> — Outras Anemias Aplásticas Especificadas. <b>Z94.8</b> – Outros órgãos e tecidos transplantados <b>G70.0</b> - Miastenia gravis</p> <p><b>G70.2</b> - Miastenia congênita e do desenvolvimento</p> <p><b>H20.1</b> — Iridociclite crônica</p> <p><b>H15.0</b> — Esclerite</p> <p><b>H30.1</b> - Inflamação coriorretiniana disseminada</p> <p><b>H30.2</b> - Ciclite posterior</p> <p><b>H30.8</b> - Outras inflamações coriorretinianas <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon</p> <p><b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas <b>L20.0</b> – Prurido de Besnier</p> <p><b>L20.8</b> – Outras dermatites atópicas</p> <p><b>L40.0</b> - Psoríase vulgar</p> <p><b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada</p> <p><b>L40.4</b> - Psoríase gutata</p> <p><b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase</p> <p><b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide</p> <p><b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo</p> <p><b>M05.0</b> - Síndrome de Felty</p> <p><b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão</p> <p><b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide</p> <p><b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas</p> <p><b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas</p> <p><b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa</p> <p><b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas</p> <p><b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal</p> <p><b>M07.2</b> - Espondilite Psoriásica</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
67	2	Ciclosporina 50 mg (por cápsula).		<p><b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b>  - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> –  Espondilite Ancilosante juvenil  <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico  <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil  <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> –  Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE</p> <p><b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas  <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]  <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil <b>M33.1</b>  - Outras dermatomiosites <b>M33.2</b> -  Polimiosite</p> <p><b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor <b>N04.1</b> -  Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares  <b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa <b>N04.3</b> -  Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa  <b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa  <b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa  <b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso  <b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente  <b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica – outras  <b>N04.9</b> – Síndrome nefrótica – não especificada</p> <p><b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> -  Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado  <b>Z94.1</b> - Coração transplantado  <b>Z94.2</b> - Pulmão transplantado  <b>Z94.3</b> - Coração e pulmões transplantados  <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado  <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
68	2	Ciclosporina 100 mg (por cápsula).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Anemia Hemolítica Autoimune</a> (D59.0 – D59.1)</li> <li>- <a href="#">Artrite Psorásica</a> (M07.0 – M07.2 - M07.3)</li> <li>- <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9)</li> <li>- <a href="#">Dermatite Atópica</a> (L20.0 – L20.8)</li> <li>- <a href="#">Dermatomiosite e Polimiosite.</a> (M33.0 – M33.1 – M33.2)</li> <li>- <a href="#">Lupus Eritematoso Sistêmico</a> (L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8)</li> <li>- <a href="#">Miastenia Gravis</a> (G70.0-G0.2)</li> <li>- <a href="#">Psoríase.</a> (L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8)</li> <li>- <a href="#">Retocolite Ulcerativa</a> (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 - K51.5 – K51.8)</li> <li>- <a href="#">Síndrome da Falência Medular</a> (D60.0 – D60.1 – D60.8 – D61.0 – D61.1 – D61.2 – D61.3 – D61.8 – Z94.8)</li> <li>- <a href="#">Síndrome Nefrótica Primária (Adulto e Infantil)</a> (N04.0 – N04.1 – N04.2 – N04.3 N04.4 – N04.5 – N04.6 – N04.7 N04.8 – N04.9)</li> <li>- <a href="#">Transplante Cardíaco.</a> (Z94.1 – T86.2)</li> <li>- <a href="#">Transplante de Coração e Pulmão</a> (Z94.3)</li> <li>- <a href="#">Transplante de Medula ou Pâncreas.</a> (Z94.8)</li> <li>- <a href="#">Transplante de Pulmão.</a> (Z94.2)</li> <li>- <a href="#">Transplante Hepático.</a> (T86.4 – Z94.4)</li> </ul>	<p><b>D59.0</b> - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga  <b>D59.1</b> - Outras anemias hemolíticas auto-imunes  <b>D60.0</b> - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha  <b>D60.1</b> - Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória  <b>D60.8</b> – Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha  <b>D61.0</b> — Anemia Aplástica Constitucional.  <b>D61.1</b> — Anemia Aplástica Induzida por Drogas.  <b>D61.2</b> — Anemia Aplástica Devida a Outros Agentes Externos.  <b>D 61.3</b> — Anemia Aplástica Idiopática.  <b>D 61.8</b> — Outras Anemias Aplásticas Especificadas.  <b>Z94.8</b> – Outros órgãos e tecidos transplantados  <b>G70.0</b> - Miastenia gravis  <b>G70.2</b> - Miastenia congênita e do desenvolvimento  <b>H20.1</b> — Iridociclite crônica  <b>H15.0</b> — Esclerite  <b>H30.1</b> - Inflamação coriorretiniana disseminada  <b>H30.2</b> - Ciclite posterior  <b>H30.8</b> - Outras inflamações coriorretinianas  <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica)  <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica)  <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica)  <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica)  <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon  <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa  <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas  <b>L20.0</b> – Prurido de Besnier  <b>L20.8</b> – Outras dermatites atópicas  <b>L40.0</b> - Psoríase vulgar  <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada  <b>L40.4</b> - Psoríase gutata  <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase  <b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
69	2	Ciclosporina 100 mg (por cápsula).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Transplante Renal</a> (T86.1 – Z94.0)</li> <li>- <a href="#">Uveítes Não Infecciosas</a>. (H15.0 – H20.1 – H30.1 – H30.2 – H30.8)</li> </ul>	<p><b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo</p> <p><b>M05.0</b> - Síndrome de Felty</p> <p><b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão</p> <p><b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide</p> <p><b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas</p> <p><b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas</p> <p><b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa</p> <p><b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas</p> <p><b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal</p> <p><b>M07.2</b> - Espondilite Psoriásica</p> <p><b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas</p> <p><b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil</p> <p><b>M08.1</b> - Espondilite Ancilosante juvenil</p> <p><b>M08.2</b> - Artrite juvenil com início sistêmico</p> <p><b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil</p> <p><b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular</p> <p><b>M08.8</b> - Outras artrites juvenis</p> <p><b>M08.9</b> - Artrite juvenil NE</p> <p><b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas</p> <p><b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]</p> <p><b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil</p> <p><b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites</p> <p><b>M33.2</b> - Polimiosite</p> <p><b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor</p> <p><b>N04.1</b> - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares</p> <p><b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa</p> <p><b>N04.3</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa</p> <p><b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
70	2	Ciclosporina 100 mg (por cápsula).		<p>endocapilar difusa</p> <p><b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa</p> <p><b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso</p> <p><b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente</p> <p><b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica – outras</p> <p><b>N04.9</b> – Síndrome nefrótica – não especificada</p> <p><b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim</p> <p><b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração</p> <p><b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado</p> <p><b>Z94.0</b> - Rim transplantado</p> <p><b>Z94.1</b> - Coração transplantado</p> <p><b>Z94.2</b> - Pulmão transplantado</p> <p><b>Z94.3</b> - Coração e pulmões transplantados</p> <p><b>Z94.4</b> - Fígado transplantado</p> <p><b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados</p>
71	2	Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Anemia Hemolítica Autoimune</a> (D59.0 – D59.1)</li> <li>- <a href="#">Artrite Psoríase</a> (M07.0 – M07.2 - M07.3)</li> <li>- <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9:)</li> <li>- <a href="#">Dermatomiosite e Polimiosite</a>. (M33.0 – M33.1 – M33.2)</li> <li>- <a href="#">Dermatite Atópica</a> (L20.0 – L20.8) (L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8)</li> <li>- <a href="#">Miastenia Gravis</a> (G70.0-G70.2)</li> <li>- <a href="#">Psoríase</a>. (L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8)</li> <li>- <a href="#">Retocolite Ulcerativa</a>. (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 - K51.5 – K51.8)</li> <li>- <a href="#">Síndrome da Falência Medular</a> (D60.0 – D60.1 – D60.8 – D61.0 –</li> </ul>	<p><b>D59.0</b> - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga</p> <p><b>D59.1</b> - Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes</p> <p><b>D60.1</b> – Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória</p> <p><b>D60.8</b> – Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha</p> <p><b>D61.0</b> — Anemia Aplástica Constitucional.</p> <p><b>D61.1</b> — Anemia Aplástica Induzida por Drogas.</p> <p><b>D61.2</b> — Anemia Aplástica Devida a Outros Agentes Externos.</p> <p><b>D61.3</b> — Anemia Aplástica Idiopática.</p> <p><b>D61.8</b> — Outras Anemias Aplásticas Especificadas.</p> <p><b>Z94.8</b> – Outros órgãos e tecidos transplantados</p> <p><b>G70.0</b> - Miastenia gravis</p> <p><b>G70.2</b> - Miastenia congênita e do desenvolvimento</p> <p><b>H20.1</b> — Iridociclite crônica</p> <p><b>H15.0</b> — Esclerite</p> <p><b>H30.1</b> - Inflamação coriorretiniana disseminada</p> <p><b>H30.2</b> - Ciclite posterior</p> <p><b>H30.8</b> - Outras inflamações coriorretinianas</p> <p><b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica)</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
72	2	Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml).	<p>D61.1 – D61.2 – D61.3 – D61.8 – Z94.8)</p> <p>- <a href="#">Síndrome Nefrótica Primária (Adulto e Infantil)</a> (N04.0 – N04.1 – N04.2 – N04.3 N04.4 – N04.5 – N04.6 – N04.7 N04.8) – <b>exceto o CID: N04.9</b></p> <p>- <a href="#">Transplante Cardíaco</a>. (Z94.1 – T86.2)</p> <p>- <a href="#">Transplante de Coração e Pulmão</a> (Z94.3)</p> <p>- <a href="#">Transplante de Medula ou Pâncreas</a>. (Z94.8)</p> <p>- <a href="#">Transplante de Pulmão</a>. (Z94.2)</p> <p>- <a href="#">Transplante Hepático</a>. (T86.4 – Z94.4)</p> <p>- <a href="#">Transplante Renal</a> (T86.1 – Z94.0)</p> <p>- <a href="#">Uveítes Não Infeciosas</a>. (H15.0 – H20.1 – H30.1 – H30.2 – H30.8)</p>	<p><b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica)</p> <p><b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon</p> <p><b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa</p> <p><b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas</p> <p><b>L20.0</b> – Prurido de Besnier</p> <p><b>L20.8</b> – Outras dermatites atópicas</p> <p><b>L40.0</b> - Psoríase vulgar</p> <p><b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada</p> <p><b>L40.4</b> - Psoríase gutata</p> <p><b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase</p> <p><b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide</p> <p><b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo</p> <p><b>M05.0</b> - Síndrome de Felty</p> <p><b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão</p> <p><b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide</p> <p><b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas</p> <p><b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas</p> <p><b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa</p> <p><b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas</p> <p><b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana</p> <p><b>M07.2</b> - Espondilite Psoriásica distal</p> <p><b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas</p> <p><b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil</p> <p><b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil</p> <p><b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico</p> <p><b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil</p> <p><b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular</p> <p><b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis</p> <p><b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE</p> <p><b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
73	2	Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml).		<p><b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]  <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil <b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites <b>M33.2</b> - Polimiosite  <b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor <b>N04.1</b> - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares  <b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa <b>N04.3</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa  <b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa  <b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa  <b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso  <b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente  <b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica - outras  <b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado  <b>Z94.1</b> - Coração transplantado  <b>Z94.2</b> - Pulmão transplantado  <b>Z94.3</b> - Coração e pulmões transplantados  <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado  <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados</p>
74	1A	Cinacalcete 30 mg (por comprimido)	<p>- <a href="#">Doença Renal Crônica - Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo e Estratégias de Atenuação</a> (N18.2 – N18.3 – N18.4 – N18.5 – N25.0 – E83.3)</p>	<p><b>N18.2</b> – Doença renal crônico estágio 2 (suave) <b>N18.3</b> – Doença renal crônico estágio 3 (moderado) <b>N18.4</b> – Doença renal crônico estágio 4 (severo)  <b>N18.5</b> – Doença renal crônico estágio 5 (dialise crônica)  <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo  <b>N25.0</b> – Osteodistrofia renal</p>
75	1A	Cinacalcete 60 mg (por comprimido)	<p>- <a href="#">Doença Renal Crônica - Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo e Estratégias de Atenuação</a> (N18.2 – N18.3 – N18.4 – N18.5 – N25.0 – E83.3)</p>	<p><b>N18.2</b> – Doença renal crônico estágio 2 (suave)  <b>N18.3</b> – Doença renal crônico estágio 3 (moderado)  <b>N18.4</b> – Doença renal crônico estágio 4 (severo)  <b>N18.5</b> – Doença renal crônico estágio 5 (dialise crônica)  <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo  <b>N25.0</b> – Osteodistrofia renal</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
76	2	Ciprofibrato 100 mg (por comprimido).	- <a href="#">Dislipidemia</a> . (E78.0 – E78.1 – E78.2 – E78.3 – E78.4 – E78.5 – E78.6 – E78.8)	<b>E78.0</b> - Hipercolesterolemia pura <b>E78.1</b> - Hiperglicéridemia pura <b>E78.2</b> - Hiperlipidemia mista <b>E78.3</b> - Hiperquilomicronemia <b>E78.4</b> - Outras hiperlipidemias <b>E78.5</b> - Hiperlipidemia não especificada <b>E78.6</b> - Deficiências de lipoproteínas <b>E78.8</b> - Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas
77	1B	Ciproterona 50 mg (por comprimido).	- <a href="#">Hiperplasia Adrenal Congênita</a> . (E25.0) - <a href="#">Puberdade Precoce Central</a> . (E22.8) - <a href="#">Síndrome de Ovários Policísticos e Hirsutismo</a> . (E28.0 – E28.2 – L68.0)	<b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise <b>E25.0</b> - Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática <b>E28.0</b> - Excesso de estrogênio <b>E28.2</b> - Síndrome do ovário policístico <b>L68.0</b> - Hirsutismo
78	1A	Cladribina 10 mg (por comprimido).	- <a href="#">Esclerose Múltipla</a> (G35.0)	G35 – Esclerose múltipla
79	2	Clobazam 10 mg (por comprimido).	- <a href="#">Epilepsia</a> . (G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)	<b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)/ crises de inic. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias
80	2	Clobazam 20 mg (por comprimido).	- <a href="#">Epilepsia</a> . (G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)	<b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)/ crises de inic. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
81	2	Clobetasol 0,5 mg/g creme (por bisnaga de 30 g)	- <a href="#">Psoríase</a> . (L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8)	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase
82	2	Clopidogrel 75 mg (por comprimido).	- <a href="#">Síndromes Coronarianas Agudas</a> . (I20.0 – I20.1 – I21.0 – I21.1 I21.2 I21.3 – I21.4 – I21.9 – I22.0 I22.1 I22.8 – I22.9 – I23.0 I23.1 I23.2 I23.3 – I23.4 – I23.5 – I23.6 – I23.8 – I24.0 – I24.8 – I24.9)	<b>I20.0</b> - Angina instável <b>I20.1</b> - Angina pectoris com espasmo documentado <b>I21.0</b> - Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio <b>I21.1</b> - Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio <b>I21.2</b> - Infarto agudo transmural do miocárdio de outras localizações <b>I21.3</b> - Infarto agudo transmural do miocárdio, de localização não especificada <b>I21.4</b> - Infarto agudo subendocárdico do miocárdio <b>I21.9</b> - Infarto agudo do miocárdio não especificado <b>I22.0</b> - Infarto do miocárdio recorrente da parede anterior <b>I22.1</b> - Infarto do miocárdio recorrente da parede inferior <b>I22.8</b> - Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações <b>I22.9</b> - Infarto do miocárdio recorrente de localização não especificada <b>I23.0</b> - Hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio <b>I23.1</b> - Comunicação interatrial como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio <b>I23.2</b> - Comunicação interventricular como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio <b>I23.3</b> - Ruptura parede coração sem ocorr. hemopericárdio como complic. atual subseq. infarto agudo miocárdio <b>I23.4</b> - Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio <b>I23.5</b> - Ruptura de músculos papilares como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio <b>I23.6</b> - Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subseq. infarto agudo do miocárdio <b>I23.8</b> - Outras complicações atuais subsequentes ao infarto agudo do miocárdio <b>I24.0</b> - Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio <b>I24.8</b> - Outras formas de doença isquêmica aguda do coração <b>I24.9</b> - Doença isquêmica aguda do coração não especificada

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
83	1A	Clozapina 25 mg (por comprimido)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Esquizofrenia MS-GO</a> (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8)</li> <li>- <a href="#">Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I</a> (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 - F31.5 – F31.6 – F31.7)</li> <li>- <a href="#">Transtorno Esquizoafetivo</a>. (F25.0 – F25.1 – F25.2)</li> <li>- <a href="#">Doença de Parkinson</a>. (G20)</li> </ul>	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide  <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica  <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica  <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada  <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica  <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual  <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples  <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias  <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco  <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo  <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto  <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos  <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos  <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado  <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos  <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos  <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto  <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão  <b>G20</b> - Doença de Parkinson</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
84	1A	Clozapina 100 mg (por comprimido).	<p>- <a href="#">Doença de Parkinson</a>. (G20)</p> <p>- <a href="#">Esquizofrenia</a> (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 – F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8)</p> <p>- <a href="#">Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I</a> (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 - F31.5 – F31.6 – F31.7)</p> <p>- <a href="#">Transtorno Esquizoafetivo</a>. (F25.0 – F25.1 – F25.2)</p>	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide  <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica  <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica  <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada  <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica  <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual  <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples  <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias  <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco  <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo  <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto  <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos  <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos  <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado  <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos  <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos  <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto  <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão  <b>G20</b> - Doença de Parkinson</p>
85	2	Codeína 30 mg (por comprimido)	- <a href="#">Dor Crônica</a> . (R52.1 – R52.2)	<p><b>R52.1</b> - Dor crônica intratável  <b>R52.2</b> - Outra dor crônica</p>
86	2	Codeína 60 mg (por comprimido).	- <a href="#">Dor Crônica</a> . (R52.1 – R52.2)	<p><b>R52.1</b> - Dor crônica intratável  <b>R52.2</b> - Outra dor crônica</p>
87	1A	Colistimetato de sódio pó para solução injetável ou inalatória contendo 80 mg (1 milhão de UI)	<p>- <a href="#">Fibrose Cística</a>.  <a href="#">(Manifestações Pulmonares e Insuficiência Pancreática)</a>  (E84.0 – E84.1 – E84.8)</p>	<p><b>E84.0</b> - Fibrose cística com manifestações pulmonares  <b>E84.1</b> - Fibrose cística com manifestações intestinais  <b>E84.8</b> - Fibrose cística com outras manifestações.</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
88	1A	Colistimetato de sódio pó para solução injetável ou inalatória contendo - 160 mg (2 milhões de UI)	- <a href="#">Fibrose Cística</a> . <a href="#">(Manifestações Pulmonares e Insuficiência Pancreática)</a> (E84.0 – E84.1 – E84.8)	<b>E84.0</b> - Fibrose cística com manifestações pulmonares <b>E84.1</b> - Fibrose cística com manifestações intestinais <b>E84.8</b> - Fibrose cística com outras manifestações.
89	2	Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico maior de 8 anos de idade - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata – por grama).	- <a href="#">Fenilcetonúria</a> . (E70.0 – E70.1)	<b>E70.0</b> - Fenilcetonúria clássica <b>E70.1</b> - Outras hiperfenilalaninemias
90	2	Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico com idade ≥ 1 ano e ≤ 8 anos - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata – por grama).	- <a href="#">Fenilcetonúria</a> . (E70.0 – E70.1)	<b>E70.0</b> - Fenilcetonúria clássica <b>E70.1</b> - Outras hiperfenilalaninemias
91	2	Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico menor de 1 ano – fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata – por grama).	- <a href="#">Fenilcetonúria</a> . (E70.0 – E70.1)	<b>E70.0</b> - Fenilcetonúria clássica <b>E70.1</b> - Outras hiperfenilalaninemias
92	1B	Danazol 100 mg (por cápsula). <b>Descontinuação da fabricação do medicamento DANAZOL (LADOGAL®) TEMPORARIAMENTE (28-03-2018)</b>	- Angioedema Associado a Deficiência de esterase (C1-INH) (D84.1) - Endometriose (N80.0 – N80.1 – N80.2 – N80.3 N80.4 – N80.5 – N80.8) - Lúpus Eritematoso Sistêmico (L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8) Púrpura Trombocitopênica Idiopática (D69.3)	<b>D69.3</b> - Púrpura trombocitopênica idiopática <b>D84.1</b> - Defeitos no sistema complemento <b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] <b>N80.0</b> - Endometriose do útero <b>N80.1</b> - Endometriose do ovário <b>N80.2</b> - Endometriose da trompa de falópio <b>N80.3</b> - Endometriose do peritônio pélvico <b>N80.4</b> - Endometriose do septo retovaginal e da vagina <b>N80.5</b> - Endometriose do intestino / <b>N80.8</b> - Outra endometriose

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <a href="#">Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo</a>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
93	2	Dapagliflozina 10 mg (por comprimido)	<p><a href="#">Diabetes Melito tipo II</a> (E11.2 – E11.3 – E11.4 – E11.5 – E11.6 – E11.7 – E11.8 – E11.9)</p> <p><a href="#">Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida</a> (I50.0 – I50.1 – I50.9)</p> <p><a href="#">Doença Renal Crônica - Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo e Estratégias de Atenuação</a> (N18.2 – N18.3 – N18.4 – N18.5)</p>	<p><b>E11.2</b> – Diabete melito não insulino-dependente com complicações renais  <b>E11.3</b> - Diabete melito não insulino-dependente com complicações oftálmicas  <b>E11.4</b> - Diabete melito não insulino-dependente com complicações neurológicas  <b>E11.5</b> - Diabete melito não insulino-dependente com complicações circulatórias periféricas  <b>E11.6</b> - Diabete melito não insulino-dependente com outras complicações especificadas  <b>E11.7</b> - Diabete melito não insulino-dependente com complicações múltiplas  <b>E11.8</b> - Diabete melito não insulino-dependente com complicações não especificadas  <b>E11.9</b> - Diabete melito não insulino-dependente sem complicações  <b>I 50.0</b> — Insuficiência cardíaca congestiva.  <b>I 50.1</b> — Insuficiência ventricular esquerda.  <b>I 50.9</b> — Insuficiência cardíaca não especificada  <b>N18.2</b> – Doença Renal Crônica estágio 2  <b>N18.3</b> – Doença Renal Crônica estágio 3  <b>N18.4</b> – Doença Renal Crônica estágio 4  <b>N18.5</b> - Doença Renal Crônica estágio 5</p>
94	1A	Deferasirox 125 mg (por comprimido).	- <a href="#">Sobrecarga de Ferro</a> . (E83.1 – T45.4)	<b>E83.1</b> - Doença do metabolismo do ferro <b>T45.4</b> - Intoxicação por ferro e seus compostos
95	1A	Deferasirox 250 mg (por comprimido).	- <a href="#">Sobrecarga de Ferro</a> . (E83.1 – T45.4)	<b>E83.1</b> - Doença do metabolismo do ferro <b>T45.4</b> - Intoxicação por ferro e seus compostos
96	1A	Deferasirox 500 mg (por comprimido).	- <a href="#">Sobrecarga de Ferro</a> . (E83.1 – T45.4)	<b>E83.1</b> - Doença do metabolismo do ferro <b>T45.4</b> - Intoxicação por ferro e seus compostos
97	1B	Deferiprona 500 mg (por comprimido).	- <a href="#">Sobrecarga de Ferro</a> . (E83.1 – T45.4)	<b>E83.1</b> - Doença do metabolismo do ferro <b>T45.4</b> - Intoxicação por ferro e seus compostos

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
98	Protocolo Estadual (RECOME)	Denosumabe 60mg/mL seringa preenchida (subcutâneo)	<p>- <a href="#">Osteoporose MS/GO</a> – ( M80.0 – M80.1 – M80.2 – M80.3 M80.4 – M80.5 – M80.8 – M80.9 - M81.0 - M81.1 – M81.2 – M81.3 – M81.4 M81.5 – M81.6 – M81.8 – M81.9 - M82.0 - M82.1 – M82.8)</p> <p><b>O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</b></p>	<p><b>M 80.0</b> — Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica.  <b>M 80.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica.  <b>M 80.2</b> — Osteoporose de desuso com fratura patológica.  <b>M 80.3</b> — Osteoporose por má absorção pós-cirúrgica com fratura patológica.  <b>M 80.4</b> — Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica.  <b>M 80.5</b> — Osteoporose idiopática com fratura patológica.  <b>M 80.8</b> — Outras osteoporoses com fratura patológica.  <b>M 80.9</b> — Osteoporose não especificada com fratura patológica  <b>M 81.0</b> — Osteoporose pós-menopáusia.  <b>M 81.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia.  <b>M 81.2</b> — Osteoporose de desuso.  <b>M 81.3</b> — Osteoporose devida à má absorção pós-cirúrgica.  <b>M 81.4</b> — Osteoporose induzida por drogas. <b>M 81.5</b> — Osteoporose idiopática.  <b>M 81.6</b> — Osteoporose localizada [Lequesne].  <b>M 81.8</b> — Outras osteoporoses. <b>M 81.9</b> — Osteoporose não especificada.  <b>M 82.0</b> — Osteoporose na mielomatose múltipla.  <b>M 82.1</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos.  <b>M 82.8</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos.</p>
99	1B	Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola).	<p>- <a href="#">Doença Renal Crônica - Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo e Estratégias de Atenuação</a> (N18.2 – N18.3 – N18.4 – N18.5 – N25.0 – E83.3)</p> <p>- <a href="#">Sobrecarga de Ferro.</a> (E83.1 – T45.4)</p>	<p><b>N18.2</b> – Doença renal crônica estágio 2 (suave) <b>N18.3</b> – Doença renal crônica estágio 3 (moderado) <b>N18.4</b> – Doença renal crônica estágio 4 (severo)  <b>N18.5</b> – Doença renal crônica estágio 5 (dialise crônica)  <b>E83.1</b> - Doença do metabolismo do ferro  <b>T45.4</b> - Intoxicação por ferro e seus compostos  <b>N25.0</b> – Osteodistrofia renal</p>
100	1A	Desmopressina 0,1 mg/ml aplicação nasal (por frasco de 2,5 ml).	<p>- <a href="#">Diabetes Insípido.</a> (E23.2)</p>	<p><b>E23.2</b> – Diabetes insípido</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
101	1A	Donepezila 5 mg (por comprimido).	- <a href="#">Doença de Alzheimer.</a> (F00.0- F00.1 – F00.2 – G30.0 – G30.1 – G30.8)	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista
102	1A	Donepezila 10 mg (por comprimido).	- <a href="#">Doença de Alzheimer.</a> (F00.0- F00.1 – F00.2 – F00.9 - G30.0 – G30.1 – G30.8)	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer
103	2	Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml).	- <a href="#">Glaucoma.</a> (H40.1 – H40.2 – H40.3 – H40.4 H40.5 – H40.6 – H40.8 – Q15.0)	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito
104	Protocolo Estadual (RECOME)	Dupilumabe 200 mg (174 mg/ml seringa preenchida com 1,14 ml)	<a href="#">Dermatite atópica</a> (L20.0 – L20.8 – L20.9)	<b>L20.0</b> — Prurigo de Besnier <b>L20.8</b> — Outras dermatites atópicas <b>L20.9</b> – Dermatite atópica, não especificada
105	Protocolo Estadual (RECOME)	Dupilumabe 300 mg (150 mg/ml seringa preenchida com 2 ml)	<a href="#">Dermatite atópica</a> (L20.0 – L20.8 – L20.9)	<b>L20.0</b> — Prurigo de Besnier <b>L20.8</b> — Outras dermatites atópicas <b>L20.9</b> – Dermatite atópica, não especificada
106	1A	Eculizumabe 10mg/mL solução injetável (frasco com 30 mL)	- <a href="#">Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN)</a>	<b>D59.5</b> – Hemoglobinúria Paroxística Noturna (Marchiafava-Micheli)

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
107	1A	Elexacaftor 50 mg/tezacaftor 25mg/ivacaftor 37,5 mg+ivacaftor 75 mg (por comprimido revestido)	- <a href="#">Fibrose Cística</a> . <a href="#">(Manifestações Pulmonares e Insuficiência Pancreática)</a> (E84.0 – E84.1 – E84.8)	<b>E84.0</b> - Fibrose cística com manifestações pulmonares <b>E84.1</b> - Fibrose cística com manifestações intestinais <b>E84.8</b> - Fibrose cística com outras manifestações.
108	1A	Elexacaftor 100 mg/tezacaftor 50 mg/ivacaftor 75 mg + ivacaftor 150 mg (por comprimido revestido)	- <a href="#">Fibrose Cística</a> . <a href="#">(Manifestações Pulmonares e Insuficiência Pancreática)</a> (E84.0 – E84.1 – E84.8)	<b>E84.0</b> - Fibrose cística com manifestações pulmonares <b>E84.1</b> - Fibrose cística com manifestações intestinais <b>E84.8</b> - Fibrose cística com outras manifestações.
109	1B	Eltrombopague olamina 25 mg (por comprimido)	- <a href="#">Púrpura Trombocitopênica Idiopática</a> . (D69.3) - <a href="#">Síndrome da Falência Medular</a> (D61.0 – D61.1 – D61.2 – D61.3 – D61.8)	<b>D61.0</b> - Anemia aplástica constitucional <b>D61.1</b> - Anemia aplástica induzida por drogas <b>D61.2</b> - Anemia aplástica devida a outros agentes externos <b>D61.3</b> - Anemia aplástica idiopática <b>D61.8</b> - Outras anemias aplásticas especificadas <b>D69.3</b> - Púrpura trombocitopênica idiopática
110	1B	Eltrombopague olamina 50 mg (por comprimido)	- <a href="#">Púrpura Trombocitopênica Idiopática</a> . (D69.3) - <a href="#">Síndrome da Falência Medular</a> (D61.0 – D61.1 – D61.2 – D61.3 – D61.8)	<b>D61.0</b> - Anemia aplástica constitucional <b>D61.1</b> - Anemia aplástica induzida por drogas <b>D61.2</b> - Anemia aplástica devida a outros agentes externos <b>D61.3</b> - Anemia aplástica idiopática <b>D61.8</b> - Outras anemias aplásticas especificadas <b>D69.3</b> - Púrpura trombocitopênica idiopática
111	1A	Enoxaparina sódica 40 mg/0,4mL solução injetável (por seringa preenchida)	- <a href="#">Tromboembolismo em Gestantes com Trombofilia</a> (D68.8 – I82.0 – I82.1 – I82.2 – I82.3 – I82.8 – O22.3 – O22.5)	<b>D68.8</b> — Outros defeitos especificados da coagulação (trombofilia, síndrome de anticorpo antilipídeo) <b>I82.0</b> — Síndrome de Budd-Chiari <b>I82.1</b> — Tromboflebite migratória <b>I82.2</b> — Embolia e Trombose de veia cava <b>I82.3</b> — Embolia e Trombose de veia renal <b>I82.8</b> — Embolia e Trombose de outras veias especificadas <b>O22.3</b> — Flebotrombose profunda na gravidez <b>O22.5</b> — Trombose venosa cerebral na gravidez

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
112	1A	Enoxaparina sódica 60 mg/0,6mL solução injetável (por seringa preenchida)	- <a href="#">Tromboembolismo em Gestantes com Trombofilia</a> (D68.8 – I82.0 – I82.1 – I82.2 – I82.3 – I82.8 – O22.3 – O22.5)	<b>D68.8</b> — Outros defeitos especificados da coagulação (trombofilia, síndrome de anticorpo antilipídeo) <b>I82.0</b> — Síndrome de Budd-Chiari <b>I82.1</b> — Tromboflebite migratória <b>I82.2</b> — Embolia e Trombose de veia cava <b>I82.3</b> — Embolia e Trombose de veia renal <b>I82.8</b> — Embolia e Trombose de outras veias especificadas <b>O22.3</b> — Flebotrombose profunda na gravidez  <b>O22.5</b> — Trombose venosa cerebral na gravidez
113	1A	Entacapona 200 mg (por comprimido).	- <a href="#">Doença de Parkinson.</a> (G20)	<b>G20</b> - Doença de Parkinson
114	1A	Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola).	- <a href="#">Artrite Psoríase</a> (M07.0 – M07.2 - M07.3) - <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.3 – M05.8 – M06.0 M06.8) - <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9)  - <a href="#">Espondilite Ancilosante.</a> (M45) e Espondilopatia Inflamatória (M46.8)  - <a href="#">Psoríase.</a> (L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8)	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE <b>M45</b> - Espondilite ancilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO - <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
114	1A	Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Artrite Psorásica</a> (M07.0 –M 07.2 - M07.3)</li> <li>- <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9)</li> <li>- <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M08.0)</li> <li>- <a href="#">Espondilite Ancilosante</a>. (M45)</li> <li>- <a href="#">Espondilopatia Inflamatória</a>. (M46.8)</li> <li>- <a href="#">Psoríase</a>.(L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8)</li> </ul>	<p><b>L40.0</b> - Psoríase vulgar  <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada  <b>L40.4</b> - Psoríase gutata  <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase  <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty  <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas  <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas  <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa  <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas  <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal  <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica  <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas  <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil  <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil  <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico  <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil  <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular  <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis  <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE  <b>M45</b> - Espondilite ancilosante  <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas</p>
115	1A	Everolimo 0,5 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Outros transplantes</a> (T86.4 – Z94.4)</li> <li>- <a href="#">Transplante Renal</a> (T86.1 – Z94.0)</li> <li>- <a href="#">Transplante Cardíaco</a>. (T86.2 – Z94.1)</li> </ul>	<p><b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim  <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração  <b>T86.4</b> -Falência ou rejeição de transplante de fígado.  <b>Z94.0</b> - Rim transplantado  <b>Z94.1</b> - Coração transplantado  <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados.</p>
116	1A	Everolimo 0,75 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Outros transplantes</a> (T86.4 – Z94.4)</li> <li>- <a href="#">Transplante Renal</a> (T86.1 – Z94.0)</li> <li>- <a href="#">Transplante Cardíaco</a>. (T86.2 – Z94.1)</li> </ul>	<p><b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim  <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração  <b>T86.4</b> -Falência ou rejeição de transplante de fígado.  <b>Z94.0</b> - Rim transplantado  <b>Z94.1</b> - Coração transplantado  <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados.</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
117	1A	Everolimo 1 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Outros transplantes</a> (T86.4 – Z94.4)</li> <li>- <a href="#">Transplante Renal</a> (T86.1 – Z94.0)</li> <li>- <a href="#">Transplante Cardíaco</a>. (T86.2 – Z94.1)</li> </ul>	<p><b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim  <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração</p> <p><b>T86.4</b> -Falência ou rejeição de transplante de fígado.  <b>Z94.0</b> - Rim transplantado  <b>Z94.1</b> - Coração transplantado  <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados.</p>
118	1A	Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças</a>. (B20.0 – B20.1 – B20.2 – B20.3 B20.4 – B20.5 – B20.6 – B20.7 B20.8 – B20.9 – B22.0 – B22.1 B22.2 – B22.7 – B23.0 – B23.1 B23.2 – B23.8 – B24)</li> <li>- <a href="#">Síndrome da Falência Medular</a> (D61.0 – D61.1 – D61.2 – D61.3 – D61.8 – D70 - Z94.8)</li> <li>- <a href="#">Síndrome Mielodisplásica de baixo risco</a> (D46.0 – D46.1 – D46.4 - D46.7)</li> <li>- <a href="#">Outros transplantes</a> (Z94.8)</li> </ul>	<p><b>B20.0</b> - Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas  <b>B20.1</b> - Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas  <b>B20.2</b> - Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica  <b>B20.3</b> - Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais  <b>B20.4</b> - Doença pelo HIV resultando em candidíase  <b>B20.5</b> - Doença pelo HIV resultando em outras micoses  <b>B20.6</b> - Doença pelo HIV resultando em pneumonia por <i>Pneumocystis jirovecii</i>  <b>B20.7</b> - Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas  <b>B20.8</b> - Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias  <b>B20.9</b> - Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada  <b>B22.0</b> - Doença pelo HIV resultando em encefalopatia  <b>B22.1</b> - Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática  <b>B22.2</b> - Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação  <b>B22.7</b> - Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte  <b>B23.0</b> - Síndrome de infecção aguda pelo hiv  <b>B23.1</b> - Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)  <b>B23.2</b> - Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificada em out. parte  <b>B23.8</b> - Doença pelo HIV resultando em outras afecções especificadas  <b>B24</b> - Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada  <b>D46.0</b> - Anemia refratária sem sideroblastos  <b>D46.1</b> - Anemia refratária com sideroblastos</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
118	1A	Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida).		<b>D46.4</b> – Anemia refratária não especificada <b>D46.7</b> - Outras síndromes mielodisplásicas <b>D61.0</b> - Anemia aplástica constitucional <b>D61.1</b> - Anemia aplástica induzida por drogas <b>D61.2</b> - Anemia aplástica devida a outros agentes externos <b>D61.3</b> - Anemia aplástica idiopática <b>D61.8</b> - Outras anemias aplásticas especificadas <b>D70</b> – Agranulocitose <b>Z94.8</b> - Outros órgãos e tecidos transplantados
119	1A	Fingolimode 0,5 mg (por cápsula).	- <a href="#">Esclerose Múltipla</a> . (G35)	<b>G35</b> – Esclerose múltipla
120	2	Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido).	- <a href="#">Hiperplasia Adrenal Congênita</a> .E25.0) - <a href="#">Insuficiência Adrenal Primária – Doença de Addison</a> . – Doença de Addison. (E27.1 – E27.4)	<b>E25.0</b> - Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática <b>E27.1</b> - Insuficiência adrenocortical primária <b>E27.4</b> - Outras insuficiências adrenocorticais e as não especificadas
121	2	Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses).	- <a href="#">Asma</a> (J45.0 – J45.1 – J45.8) - <a href="#">Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO</a> (J44.0 – J44.1 – J44.8)	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica <b>J45.0</b> - Asma predominantemente alérgica <b>J45.1</b> - Asma não-alérgica <b>J45.8</b> - Asma mista
122	2	Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses).	- <a href="#">Asma</a> (J45.0 – J45.1 – J45.8) - <a href="#">Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO</a> (J44.0 – J44.1 – J44.8)	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica <b>J45.0</b> - Asma predominantemente alérgica <b>J45.1</b> - Asma não-alérgica <b>J45.8</b> - Asma mista

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
123	2	Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Asma</a> (J45.0 – J45.1 – J45.8)</li> <li>- <a href="#">Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO</a> (J44.0 – J44.1 – J44.8)</li> </ul>	<p><b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior</p> <p><b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada</p> <p><b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica</p> <p><b>J45.0</b> - Asma predominantemente alérgica</p> <p><b>J45.1</b> - Asma não-alérgica</p> <p><b>J45.8</b> - Asma mista</p>
124	1A	Fumarato de Dimetila 120 mg (por comprimido)	- <a href="#">Esclerose Múltipla</a> . (G35)	<b>G35</b> – Esclerose Múltipla.
125	1A	Fumarato de Dimetila 240 mg (por comprimido)	- <a href="#">Esclerose Múltipla</a> . (G35)	<b>G35</b> – Esclerose Múltipla.
126	2	Gabapentina 300 mg (por cápsula).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Dor Crônica</a>. (R52.1 – R52.2)</li> <li>- <a href="#">Epilepsia</a>. (G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)</li> </ul>	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal</p> <p><b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p> <p><b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p><b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais</p> <p><b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)</p> <p><b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal</p> <p><b>G40.8</b> - Outras epilepsias <b>R52.1</b> - Dor crônica intratável <b>R52.2</b> - Outra dor crônica</p>
127	2	Gabapentina 400 mg (por cápsula).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Dor Crônica</a>. (R52.1 – R52.2)</li> <li>- <a href="#">Epilepsia</a>. (G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)</li> </ul>	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal</p> <p><b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p> <p><b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p><b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas</p> <p><b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas</p> <p><b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
	2	Gabapentina 400 mg (por cápsula).		<b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias <b>R52.1</b> - Dor crônica intratável <b>R52.2</b> - Outra dor crônica
128	1A	Galantamina 8 mg (por cápsula de liberação prolongada).	- <a href="#">Doença de Alzheimer.</a> (F00.0- F00.1 – F00.2 – F00.9 - G30.0 – G30.1 – G30.8)	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer
129	1A	Galantamina 16 mg (por cápsula de liberação prolongada).	- <a href="#">Doença de Alzheimer.</a> (F00.0- F00.1 – F00.2 – F00.9 - G30.0 – G30.1 – G30.8)	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer
130	1A	Galantamina 24 mg (por cápsula de liberação prolongada).	- <a href="#">Doença de Alzheimer.</a> (F00.0- F00.1 – F00.2 – F00.9 - G30.0 – G30.1 – G30.8)	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer
132	1A	Galsulfase 1 mg/mL solução injetável (por frasco ampola de 5mL)	- <a href="#">Mucopolissacaridose do tipo VI</a> (Síndrome Maroteaux-Lamy)	<b>E76.2</b> - Outras mucopolissacaridoses
131	1A	Glatirâmer 40 mg injetável (por seringa preenchida).	- <a href="#">Esclerose Múltipla.</a> (G35)	<b>G35</b> – Esclerose múltipla

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
132	1A	Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Artrite Psoríase</a> (M07.0 – M07.2 - M07.3)</li> <li>- <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.1 – M05.2- M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8)</li> <li>- <a href="#">Espondilite Ancilosante</a>. (M45)</li> </ul>	<p><b>M05.0</b> - Síndrome de Felty  <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão  <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide  <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas  <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas  <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa  <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas  <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal.  <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica  <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas.</p>
133	1B	Goserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Endometriose</a>. (N80.0 – N80.1 – N80.2 – N80.3 N80.4 – N80.5 – N80.8)</li> <li>- <a href="#">Leiomioma de Útero</a>. (D25.0 – D25.1 – D25.2)</li> <li>- <a href="#">Puberdade Precoce Central</a>. (E22.8)</li> </ul>	<p><b>D25.0</b> - Leiomioma submucoso do útero  <b>D25.1</b> - Leiomioma intramural do útero  <b>D25.2</b> - Leiomioma subseroso do útero  <b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise  <b>N80.0</b> - Endometriose do útero  <b>N80.1</b> - Endometriose do ovário  <b>N80.2</b> - Endometriose da trompa de falópio  <b>N80.3</b> - Endometriose do peritônio pélvico  <b>N80.4</b> - Endometriose do septo retovaginal e da vagina  <b>N80.5</b> - Endometriose do intestino  <b>N80.8</b> - Outra endometriose</p>
134	1B	Goserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Endometriose</a>. (N80.0 – N80.1 – N80.2 – N80.3 N80.4 – N80.5 – N80.8)</li> <li>- <a href="#">Leiomioma de Útero</a>. (D25.0 – D25.1 – D25.2)</li> <li>- <a href="#">Puberdade Precoce Central</a>. (E22.8)</li> </ul>	<p><b>D25.0</b> - Leiomioma submucoso do útero  <b>D25.1</b> - Leiomioma intramural do útero  <b>D25.2</b> - Leiomioma subseroso do útero  <b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise  <b>N80.0</b> - Endometriose do útero  <b>N80.1</b> - Endometriose do ovário  <b>N80.2</b> - Endometriose da trompa de falópio  <b>N80.3</b> - Endometriose do peritônio pélvico  <b>N80.4</b> - Endometriose do septo retovaginal e da vagina  <b>N80.5</b> - Endometriose do intestino  <b>N80.8</b> - Outra endometriose</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
135	2	Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0)</li> <li>- <a href="#">Dermatomiosite e Polimiosite</a>. (M33.0 – M33.1 – M33.2) <b>EXCETO M33.2</b></li> <li>- <a href="#">Lupus Eritematoso Sistêmico</a> (L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8)</li> </ul>	<p><b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide  <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo  <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty  <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão  <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide  <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas  <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas  <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa  <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas  <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil  <b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas  <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]  <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil  <b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites</p>
136	1B	Hidroxiureia 500 mg (por cápsula).	- <a href="#">Doença Falciforme</a> . ( D57.0 – D57.1 D57.2)	<p><b>D57.0</b> - Anemia falciforme com crise  <b>D57.1</b> - Anemia falciforme sem crise  <b>D57.2</b> - Transtornos falciformes heterozigóticos duplos</p>
137	1A	Idursulfase Alfa 2mg/mL solução injetável (frasco com 3mL)	- <a href="#">Mucopolissacaridose do tipo II</a> (E76.1)	<b>E76.1</b> – Mucopolissacaridose do tipo II
138	1B	Iloprosta 10 mcg/mL (solução para nebulização ampola de 1mL)	- <a href="#">Hipertensão Arterial Pulmonar</a> . (I27.0 – I27.2 – I27.8)	<p><b>I27.0</b> - Hipertensão pulmonar primária  <b>I27.2</b> - Outra hipertensão pulmonar secundária  <b>I27.8</b> - Outras doenças pulmonares do coração especificadas</p>
139	1A	Imiglucerase 400 U injetável (por frasco-ampola).	- <a href="#">Doença de Fabry e Doença de Gaucher</a> . (E75.2)	<b>E75.2</b> - Outras esfingolipidoses
140	1A	Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Anemia Hemolítica Autoimune</a> (D59.0 – D59.1)</li> <li>- <a href="#">Dermatomiosite e Polimiosite</a>. (M33.0 – M33.1 – M33.2)</li> <li>- <a href="#">Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças</a>. (B20.0 –</li> </ul>	<p><b>B20.0</b> - Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas  <b>B20.1</b> - Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas  <b>B20.2</b> - Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica  <b>B20.3</b> - Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
			<p>B20.1 – B20.2 – B20.3 B20.4 – B20.5 – B20.6 – B20.7 B20.8 – B20.9 – B22.0 – B22.1 B22.2 – B22.7 – B23.0 – B23.1 B23.2 – B23.8 – B24)</p> <p>- <a href="#">Imunodeficiência Primária</a>. (D80.0 – D80.1 – D80.3 – D80.5 D80.6 – D80.7 – D80.8 – D81.0 D81.1 – D81.2 – D81.3 – D81.4 D81.5 – D81.6 – D81.7 – D81.8 D82.0 – D82.1 – D83.0 – D83.2 D83.8)</p> <p>- <a href="#">Miastenia Gravis</a>. (G70.0-G70.2)</p> <p>- <a href="#">Púrpura Trombocitopênica Idiopática</a>. (D69.3)</p> <p>- <a href="#">Síndrome de Guillain-Barré</a> (G61.0)</p> <p>- <a href="#">Síndrome da Falência Medular</a> (D60.0 – D60.1 – D60.8 – D61.0)</p> <p>- <a href="#">Síndrome Inflamatória Multissistêmica Infantil associada a COVID-19 (SIM-P)</a> (B34.2) - <b>para pacientes com idade ≤ 19 anos</b></p> <p>- <a href="#">Transplante Renal</a> (T86.1 – Z94.0)</p>	<p><b>B20.4</b> - Doença pelo HIV resultando em candidíase  <b>B20.5</b> - Doença pelo HIV resultando em outras micoses  <b>B20.6</b> - Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis jirovecii  <b>B20.7</b> - Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas  <b>B20.8</b> - Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias  <b>B20.9</b> - Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada  <b>B22.0</b> - Doença pelo HIV resultando em encefalopatia  <b>B22.1</b> - Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática  <b>B22.2</b> - Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação  <b>B22.7</b> - Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte  <b>B23.0</b> - Síndrome de infecção aguda pelo hiv  <b>B23.1</b> - Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)  <b>B23.2</b> - Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificada em out. parte  <b>B23.8</b> - Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas  <b>B24</b> - Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada  <b>B 34.2</b> — Infecção por coronavírus de localização não especificada.  <b>D59.0</b> - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga  <b>D59.1</b> - Outras anemias hemolíticas auto-íunes  <b>D60.0</b> - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha  <b>D60.1</b> – Aplasia pura de glóbulos vermelhos adquirida transitória  <b>D61.0</b> - Anemia aplástica constitucional  <b>D60. 8</b> – Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha  <b>D69.3</b> - Púrpura trombocitopênica idiopática  <b>D80.0</b> - Hipogamaglobulinemia hereditária</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <a href="#">Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo</a>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
				<p><b>D80.1</b> - Hipogamaglobulinemia não familiar  <b>D80.3</b> - Deficiência seletiva de subclasses de imunoglobulina G [IGG]  <b>D80.5</b> - Imunodeficiência com aumento de imunoglobulina M [IGM]  <b>D80.6</b> - Deficiência de anticorpos com imunoglobulinas próximas do normal ou com hiperimmunoglobulinemia  <b>D80.7</b> - Hipogamaglobulinemia transitória da infância  <b>D80.8</b> - Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de anticorpos  <b>D81.0</b> - Imunodeficiência combinada grave [SCID] com disgenesia reticular  <b>D81.1</b> - Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos de células T e B  <b>D81.2</b> - Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos ou normais de células B  <b>D81.3</b> - Deficiência de adenosina-deaminase [ADA]  <b>D81.4</b> - Síndrome de nezelof  <b>D81.5</b> - Deficiência de purina-nucleosídeo fosforilase [pnp]  <b>D81.6</b> - Deficiência major classe I do complexo de histocompatibilidade  <b>D81.7</b> - Deficiência major classe II do complexo de histocompatibilidade  <b>D81.8</b> - Outras deficiências imunitárias combinadas  <b>D82.0</b> - Síndrome de Wiskott-Aldrich  <b>D82.1</b> - Síndrome de di George  <b>D83.0</b> - Imunodeficiência comum variável com predominância de anormal. do número e da função das células B  <b>D83.2</b> - Imunodeficiência comum variável com auto-anticorpos às células B ou T  <b>D83.8</b> - Outras imunodeficiências comuns variáveis  <b>G61.0</b> - Síndrome de guillain-barré  <b>G70.0</b> - Miastenia gravis  <b>G70.2</b> - Miastenia congênita e do desenvolvimento  <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
				<b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites <b>M33.2</b> - Polimiosite <b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>Z94.0</b> - Rim transplantado
141	1A	Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml).	<p>- <a href="#">Artrite Psoriásica</a> (M07.0 – M 07.2 - M07.3)</p> <p>- <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9)</p> <p>- <a href="#">Doença de Crohn</a>.K50.0 – K50.1 – K50.8)</p> <p>- <a href="#">Espondilite Ancilosante</a>. (M45)</p> <p>- <a href="#">Espondilopatia Inflamatória</a>.(M46.8)</p> <p>- <a href="#">Retocolite Ulcerativa</a>. ((K51.0 – K51.2 – K51.3 K51.5 – K51.8 )</p>	<b>K50.0</b> - Doença de Crohn do intestino delgado <b>K50.1</b> - Doença de Crohn do intestino grosso <b>K50.8</b> – Outra forma de Doença de Crohn <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8 - Outras artrites reumatóides especificadas</b> <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalângiana distal <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M45</b> - Espondilite ancilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
142	1A	Insulina análoga de ação rápida (Solução injetável 100 UI/mL)	- <a href="#">Diabetes Mellito tipo I</a> (E10.0 – E10.1- E10.2 – E10.3 – E10.4 – E10.5 – E10.6- E10.7 -E10.8 – E10.9)	<p><b>E10.0</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com coma</p> <p><b>E10.1</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com cetoacidose</p> <p><b>E10.2</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações renais</p> <p><b>E10.3</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações oftálmicas</p> <p><b>E10.4</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações neurológicas</p> <p><b>E10.5</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações circulatórias periféricas</p> <p><b>E10.6</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com outras complicações especificadas</p> <p><b>E10.7</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações múltiplas</p> <p><b>E10.8</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações não especificadas</p> <p><b>E10.9</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – sem complicações</p>
143	1A	Insulina análoga de ação prolongada (Solução injetável 100 UI/mL)	<a href="#">Diabetes Mellito tipo I</a> (E10.0 – E10.1- E10.2 – E10.3 – E10.4 – E10.5 – E10.6- E10.7 -E10.8 – E10.9)	<p><b>E10.0</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com coma</p> <p><b>E10.1</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com cetoacidose</p> <p><b>E10.2</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações renais</p> <p><b>E10.3</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações oftálmicas</p> <p><b>E10.4</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações neurológicas</p> <p><b>E10.5</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações circulatórias periféricas</p> <p><b>E10.6</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com outras complicações especificadas</p> <p><b>E10.7</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações múltiplas</p> <p><b>E10.8</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações não especificadas</p> <p><b>E10.9</b> Diabetes mellitus insulino-dependente – sem complicações</p>
144	2	Isotretinoína 20 mg (por cápsula).	- <a href="#">Acne</a> . L70.0 – L70.1 – L70.8)	<p><b>L70.0</b> - Acne vulgar</p> <p><b>L70.1</b> - Acne conglobata</p> <p><b>L70.8</b> - Outras formas de acne</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
145	1A	Ivacaftor 150 mg (por comprimido revestido)	<p align="center"><u>- Fibrose Cística.</u></p> <p><u>(Manifestações Pulmonares e Insuficiência Pancreática)</u> (E84.0 – E84.8)</p>	<p><b>E84.0</b> - Fibrose cística com manifestações pulmonares  <b>E84.8</b> - Fibrose cística com outras manifestações</p>
146	2	Lamotrigina 25 mg (por comprimido).	<p>- <u>Epilepsia.</u>(G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)</p> <p>- <u>Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I</u> (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 - F31.5 – F31.6 – F31.7)</p>	<p><b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos  <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos  <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado  <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos  <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos  <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto  <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão <b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. Focal  <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples  <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas  <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais  <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)  <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal  <b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
147	2	Lamotrigina 50 mg (por comprimido).	<p>- <a href="#">Epilepsia</a>.(G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)</p> <p>- <a href="#">Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I</a> (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 - F31.5 – F31.6 – F31.7)12</p>	<p><b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos  <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos  <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado  <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos  <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos  <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto  <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão <b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de inic. Focal  <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples  <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas  <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais  <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)  <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal  <b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
148	2	Lamotrigina 100 mg (por comprimido).	<p>- <a href="#">Epilepsia</a>.(G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)</p> <p>- <a href="#">Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I</a> (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 - F31.5 – F31.6 – F31.7)</p>	<p><b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos  <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos  <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado  <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos  <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos  <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto  <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão <b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal  <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples  <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas  <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais  <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)  <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal  <b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>
149	1A	Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida).	- <a href="#">Acromegalia</a> (E22.0)	<b>E22.0</b> - Acromegalia e gigantismo hipofisário
150	1A	Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida).	- <a href="#">Acromegalia</a> (E22.0)	<b>E22.0</b> - Acromegalia e gigantismo hipofisário
151	1A	Laronidase 0,58 mg/mL solução injetável (frasco com 5mL);	- <a href="#">Mucopolissacaridose do tipo I</a> (E76.0)	<b>E 76.0</b> – Mucopolissacaridose do tipo I

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
152	1A	Latanoprosta 0,05 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5 ml).	- <a href="#">Glaucoma</a> ..(H40.1 – H40.2 – H40.3 – H40.4 H40.5 – H40.6 – H40.8 – Q15.0)	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito
153	1A	Leflunomida 20 mg (por comprimido).	- <a href="#">Artrite Psorásica</a> (M07.0 – M07.2 - M07.3) - <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.3 – M05.8 – M06.0 M06.8 - M08.0)	<b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal <b>M07.2</b> - Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil
154	1B	Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola).	- <a href="#">Endometriose</a> (N80.0 – N80.1 – N80.2 – N80.3 N80.4 – N80.5 – N80.8) - <a href="#">Leiomioma de Útero</a> ..(D25.0 – D25.1 – D25.2) - <a href="#">Puberdade Precoce Central</a> . (E22.8)	<b>D25.0</b> - Leiomioma submucoso do útero <b>D25.1</b> - Leiomioma intramural do útero <b>D25.2</b> - Leiomioma subseroso do útero <b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise <b>N80.0</b> - Endometriose do útero <b>N80.1</b> - Endometriose do ovário <b>N80.2</b> - Endometriose da trompa de falópio <b>N80.3</b> - Endometriose do peritônio pélvico <b>N80.4</b> - Endometriose do septo retovaginal e da vagina <b>N80.5</b> - Endometriose do intestino <b>N80.8</b> - Outra endometriose

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
155	1B	Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola). <b>Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica Abbvie em 04/2022.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Endometriose</a> (N80.0 – N80.1 – N80.2 – N80.3 N80.4 – N80.5 – N80.8)</li> <li>- <a href="#">Leiomioma de Útero.</a>(D25.0 – D25.1 – D25.2)</li> <li>- <a href="#">Puberdade Precoce Central.</a> (E22.8)</li> </ul>	<p><b>D25.0</b> - Leiomioma submucoso do útero <b>D25.1</b> - Leiomioma intramural do útero <b>D25.2</b> - Leiomioma subseroso do útero <b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise <b>N80.0</b> - Endometriose do útero</p> <p><b>N80.1</b> - Endometriose do ovário</p> <p><b>N80.2</b> - Endometriose da trompa de falópio</p> <p><b>N80.3</b> - Endometriose do peritônio pélvico</p> <p><b>N80.4</b> - Endometriose do septo retovaginal e da vagina</p> <p><b>N80.5</b> - Endometriose do intestino</p> <p><b>N80.8</b> - Outra endometriose</p>
156	1B	Leuprorrelina 45 mg (acetato) injetável (seringa preenchida)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Puberdade Precoce Central.</a>(E22.8)</li> </ul>	<p><b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise</p>
157	1A	Levetiracetam 100 mg/mL solução oral	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Epilepsia.</a> (G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)</li> </ul>	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)/ crises de inc. focal</p> <p><b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p> <p><b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p><b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais</p> <p><b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)</p> <p><b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal</p> <p><b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>
158	1A	Levetiracetam 250 mg (por comprimido)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Epilepsia.</a> (G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)</li> </ul>	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)/ crises de inc. focal</p> <p><b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p> <p><b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas</p> <p><b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais</p> <p><b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)</p> <p><b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
159	1A	Levetiracetam 750 mg (por comprimido)	- <a href="#">Epilepsia</a> . (G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal  <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples  <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas  <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas  <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas  <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais  <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)  <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal</p>
160	Protocolo Estadual (RECOME)	Liraglutida 6mg/mL solução injetável (caneta preenchida com 3mL)	- <a href="#">Obesidade (crianças e adolescentes)</a> (E66.0 – E66.1 – E66.2 – E66.8 – E66.9)	<p><b>E 66.0</b> — Obesidade devida a excesso de calorias  <b>E 66.1</b> — Obesidade induzida por drogas  <b>E 66.2</b> — Obesidade extrema com hipoventilação alveolar  <b>E 66.8</b> — Outra obesidade  <b>E 66.9</b> — Obesidade não especificada</p>
161	1A	Memantina 10 mg (por comprimido)	- <a href="#">Doença de Alzheimer</a> . (F00.0- F00.1 – F00.2 – F00.9 - G30.0 – G30.1 – G30.8)	<p><b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce  <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio  <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer  <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce  <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio  <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista  <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer</p>
162	1B	Mepolizumabe 100 mg/mL solução injetável	- <a href="#">Asma</a> (J45.0 – J45.1 – J45.8)	<p><b>J45.0</b> - Asma predominantemente alérgica  <b>J45.1</b> - Asma não-alérgica  <b>J45.8</b> - Asma mista</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
163	2	Mesalazina 400 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Doença de Crohn</a>.(K50.0 – K50.1 – K50.8)</li> <li>- <a href="#">Retocolite Ulcerativa</a>. (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 - K51.5 – K51.8)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>K50.0</b> - Doença de crohn do intestino delgado</li> <li><b>K50.1</b> - Doença de crohn do intestino grosso</li> <li><b>K50.8</b> - Outra forma de doença de crohn</li> <li><b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica)</li> <li><b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica)</li> <li><b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica)</li> <li><b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica)</li> <li><b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon</li> <li><b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa</li> <li><b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas</li> </ul>
164	2	Mesalazina 500 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Doença de Crohn</a>. (K50.0 – K50.1 – K50.8)</li> <li>- <a href="#">Retocolite Ulcerativa</a>. (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 - K51.5 – K51.8)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>K50.0</b> - Doença de crohn do intestino delgado</li> <li><b>K50.1</b> - Doença de crohn do intestino grosso</li> <li><b>K50.8</b> - Outra forma de doença de crohn</li> <li><b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica)</li> <li><b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica)</li> <li><b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica)</li> <li><b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica)</li> <li><b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon</li> <li><b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa</li> <li><b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas</li> </ul>
165	2	Mesalazina 500 mg (por supositório).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Retocolite Ulcerativa</a>. (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 - K51.5 – K51.8 )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica)</li> <li><b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica)</li> <li><b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica)</li> <li><b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica)</li> <li><b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon</li> <li><b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa</li> <li><b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas</li> </ul>
166	2	Mesalazina 800 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Doença de Crohn</a>..(K50.0 – K50.1 – K50.8)</li> <li>- <a href="#">Retocolite Ulcerativa</a>. (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 - K51.5 – K51.8)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>K50.0</b> - Doença de crohn do intestino delgado</li> <li><b>K50.1</b> - Doença de crohn do intestino grosso</li> <li><b>K50.8</b> - Outra forma de doença de crohn</li> <li><b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) / <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica)</li> <li><b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) / <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica)</li> <li><b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon / <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa</li> <li><b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas</li> </ul>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
167	2	Mesalazina 1000 mg (por supositório).	- <a href="#">Retocolite Ulcerativa</a> . (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 - K51.5 – K51.8)	<b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas
168	2	Mesalazina 2 g (por sachê).	- <a href="#">Retocolite Ulcerativa</a> . (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 - K51.5 – K51.8)	<b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas
169	2	Metadona 5 mg (por comprimido).	- <a href="#">Dor Crônica</a> .(R52.1 – R52.2)	<b>R52.1</b> - Dor crônica intratável/ <b>R52.2</b> - Outra dor crônica
170	1A	Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)	- <a href="#">Artrite Psoríase</a> (M07.0 –M07.2 - M07.3) - <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9) - <a href="#">Dermatomiosite e Polimiosite</a> .(M33.0 – M33.1 – M33.2) - <a href="#">Esclerose Sistêmica</a> .. (M34.0 – M34.1 – M34.8) - <a href="#">Espondilite Ancilosante</a> .M45) - <a href="#">Espondilopatia Inflamatória</a> .(M46.8) - <a href="#">Lupus Eritematoso Sistêmico</a> .(L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8) - <a href="#">Psoríase</a> .L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8)	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
	1A	Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)		<b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE  <b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil <b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites <b>M33.2</b> - Polimiosite <b>M34.0</b> - Esclerose sistêmica progressiva <b>M34.1</b> - Síndrome cr(e)st <b>M34.8</b> - Outras formas de esclerose sistêmica <b>M45</b> - Espondilite ancilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificada
171	1A	Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Artrite Psorásica</a>.(M07.0 – M07.2 -M07.3)</li> <li>- <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9)</li> <li>- <a href="#">Dermatomiosite e Polimiosite</a>.M33.0 – M33.1 – M33.2)</li> <li>- <a href="#">Doença de Crohn</a>.(K50.0 – K50.1 – K50.8)</li> <li>- <a href="#">Esclerose Sistêmica</a>.. (M34.0 – M34.1 – M34.8)</li> <li>- <a href="#">Espondilite Ancilosante</a>.M45)</li> <li>- <a href="#">Espondilopatia Inflamatória</a>.. (M46.8)</li> <li>- <a href="#">Lupus Eritematoso Sistêmico</a>.(L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8)</li> <li>- <a href="#">Psoríase</a>..(L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8)</li> </ul>	<b>K50.0</b> - Doença de crohn do intestino delgado <b>K50.1</b> - Doença de crohn do intestino grosso <b>K50.8</b> - Outra forma de doença de crohn <b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas  <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <a href="#">Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo</a>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
	1A	Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml).		<p><b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular  <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis  <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE</p> <p><b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas  <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]  <b>M33.0</b> - Dermatomiosite juvenil  <b>M33.1</b> - Outras dermatomiosites  <b>M33.2</b> - Polimiosite  <b>M34.0</b> - Esclerose sistêmica progressiva  <b>M34.1</b> - Síndrome cr(e)st  <b>M34.8</b> - Outras formas de esclerose sistêmica</p> <p><b>M45</b> - Espondilite anquilosante  <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificada</p>
172	1A	Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido).	<p>- <a href="#">Lupus Eritrematoso Sistêmico</a>. (L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8)</p> <p>- <a href="#">Transplante Renal</a> (T86.1 – Z94.0)</p> <p><a href="#">Outros Transplantes</a> - (Transplante Cardíaco/Z94.1-Transplante Hepático/T86.4 – Z94.4)</p>	<p><b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide  <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo  <b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas  <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]  <b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado  <b>Z94.1</b> - Coração transplantado  <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado</p>
173	1A	Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido).	<p>- <a href="#">Transplante Renal</a> (T86.1 – Z94.0)</p> <p>- <a href="#">Outros Transplantes</a> - (Transplante Cardíaco/Z94.1 – T86.2)</p> <p>-Transplante Hepático/T86.4 – Z94.4)</p>	<p><b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado  <b>Z94.1</b> - Coração transplantado  <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
174	1A	Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido).	- <a href="#">Transplante Renal</a> (T86.1 – Z94.0) - <a href="#">Outros Transplantes</a> - (Transplante Cardíaco/Z94.1-Transplante Hepático/T86.4 – Z94.4))	<b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.4</b> - Fígado transplantad
175	1A	Miglustate 100 mg (por cápsula).	- <a href="#">Doença de Gaucher</a> ..(E75.2)	<b>E75.2</b> - Outras esfingolipidoses
176	2	Morfina 10 mg (por comprimido).	- <a href="#">Dor Crônica</a> .R52.1 – R52.2)	<b>R52.1</b> - Dor crônica intratável <b>R52.2</b> – Outra dor crônica
177	2	Morfina 30 mg (por comprimido).	- <a href="#">Dor Crônica</a> ..(R52.1 – R52.2)	<b>R52.1</b> - Dor crônica intratável <b>R52.2</b> – Outra dor crônica
178	2	Naproxeno 500 mg (por comprimido).	- <a href="#">Artrite Psoríase</a> ..(M07.0 – M07.2 - M07.3) - <a href="#">Artrite Reumatóide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9) - <a href="#">Espondilite Ancilosante</a> .M45) - <a href="#">Espondilopatia Inflamatória</a> .M46.8)	<b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE <b>M45</b> - Espondilite ancilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
179	1A	Natalizumabe 300 mg (por frasco ampola).	- <a href="#">Esclerose Múltipla</a> .G35)	G35 – Esclerose múltipla
180	Protocolo Estadual (RECOME)	Nintedanibe 100 mg (por cápsula)	- <a href="#">Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI)</a> (J84.1) <b>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás)</b> <b>O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</b>	J84.1 – Outras doenças pulmonares intersticiais com fibrose
181	Protocolo Estadual (RECOME)	Nintedanibe 150 mg (por cápsula)	- <a href="#">Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI)</a> (J84.1) <b>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás)</b> <b>O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</b>	J84.1 – Outras doenças pulmonares intersticiais com fibrose
182	1A	Nusinersena 2,4mg/mL injetável - Intratectal (frasco ampola com 5mL)	- <a href="#">Atrofia Muscular Espinhal (AME) 5q tipos I e II</a> (G12.0 – G12.1)	G12.0 - Atrofia muscular espinal infantil tipo I (Werdnig-Hoffman) G 12.1 – Outras atrofas musculares espinais hereditárias
183	1B	Octreotida lar 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola).	- <a href="#">Acromegalia</a> . E22.0)	E22.0 - Acromegalia e gigantismo hipofisário
184	1A	Octreotida 20 mg/ml injetável (por frasco-ampola).	- <a href="#">Acromegalia</a> . E22.0)	E22.0 - Acromegalia e gigantismo hipofisário
185	1A	Octreotida 30 mg/ml injetável (por frasco-ampola).	- <a href="#">Acromegalia</a> . E22.0)	E22.0 - Acromegalia e gigantismo hipofisário

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
186	1A	Olanzapina 5 mg (por comprimido).	<p><a href="#">-Esquizofrenia MS-GO</a> F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 – F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8)</p> <p>- <a href="#">Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I</a> (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 – F31.5 – F31.6 – F31.7)</p>	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide  <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica  <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica  <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada  <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica  <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual  <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples  <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias  <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco  <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo  <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto  <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos  <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos  <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado  <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos  <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos  <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto  <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <a href="#">Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo</a>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
187	1A	Olanzapina 10 mg (por comprimido).	<p><a href="#">-Esquizofrenia MS-GO</a> (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 – F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8)</p> <p><a href="#">- Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I</a> (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 – F31.5 – F31.6 – F31.7)</p>	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide  <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica  <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica  <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada  <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica  <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual  <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples  <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias  <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco  <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo  <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto  <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos  <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos  <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado  <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos  <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos  <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto  <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão</p>
188	1B	Omalizumabe 150 mg (pó para solução injetável)	- <a href="#">Asma</a> (J45.0 – J45.8)	<p><b>J45.8</b> - Asma mista  <b>J45.0</b> - Asma predominantemente alérgica</p>
189	Protocolo Estadual (RECOME)	Paliperidona (Palmitato) liberação prolongada <b>MENSAL</b> (seringa preenchida) <b>50 mg</b> <b>SOMENTE PARA</b>	- <a href="#">Esquizofrenia MS-GO</a> (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.5 – F20.6 – F20.8)	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide  <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica  <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica  <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada  <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual  <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
		<b>PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE</b>		F20.8 - Outras esquizofrenias
190	Protocolo Estadual (RECOME)	Paliperidona (Palmitato) liberação prolongada <b>MENSAL</b> (seringa preenchida) <b>75 mg</b> <b>SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE</b>	- <a href="#">Esquizofrenia MS-GO</a> (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.5 – F20.6 – F20.8)	F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias
191	Protocolo Estadual (RECOME)	Paliperidona (Palmitato) liberação prolongada <b>MENSAL</b> (seringa preenchida) <b>100 mg</b> <b>SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE</b>	- <a href="#">Esquizofrenia MS-GO</a> (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.5 – F20.6 – F20.8)	F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias
192	Protocolo Estadual (RECOME)	Paliperidona (Palmitato) liberação prolongada <b>MENSAL</b> (seringa preenchida) <b>150 mg</b> <b>SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE</b>	- <a href="#">Esquizofrenia MS-GO</a> (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.5 – F20.6 – F20.8)	F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias
193	Protocolo Estadual (RECOME)	Paliperidona (Palmitato) liberação prolongada <b>TRIMESTRAL</b> (seringa preenchida) <b>175 mg</b> <b>SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE</b>	- <a href="#">Esquizofrenia MS-GO</a> (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.5 – F20.6 – F20.8)	F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
194	Protocolo Estadual (RECOME)	Paliperidona (Palmitato) liberação prolongada <b>TRIMESTRAL</b> (seringa preenchida) <b>263 mg</b> <b>SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE</b>	- <a href="#">Esquizofrenia MS-GO</a> (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.5 – F20.6 – F20.8)	<b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias
195	Protocolo Estadual (RECOME)	Paliperidona (Palmitato) liberação prolongada <b>TRIMESTRAL</b> (seringa preenchida) <b>350 mg</b> <b>SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE</b>	- <a href="#">Esquizofrenia MS-GO</a> (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.5 – F20.6 – F20.8)	<b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias
196	Protocolo Estadual (RECOME)	Paliperidona (Palmitato) liberação prolongada <b>TRIMESTRAL</b> (seringa preenchida) <b>525 mg</b> <b>SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE</b>	- <a href="#">Esquizofrenia MS-GO</a> (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.5 – F20.6 – F20.8)	<b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias
197	2	Pamidronato 60 mg injetável (frasco-ampola)	- <a href="#">Osteoporose – PCDT/MS</a> (M80.0 – M80.1 – M80.2 – M80.3 – M80.4 – M80.5 – M80.8 – M81.0 - M81.1 – M81.2 – M81.3 – M81.4 M81.5 – M81.6 – M81.8 – M82.0 - M82.1 – M82.8)	<b>M80.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica <b>M80.1</b> - Osteoporose pós-ooftorectomia com fratura patológica <b>M80.2</b> - Osteoporose de desuso com fratura patológica <b>M80.3</b> - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica <b>M80.4</b> - Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica <b>M80.5</b> - Osteoporose idiopática com fratura patológica <b>M80.8</b> - Outras osteoporoses com fratura patológica

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
				<b>M81.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia <b>M81.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia <b>M81.2</b> - Osteoporose de desuso <b>M81.3</b> - Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica <b>M81.4</b> - Osteoporose induzida por drogas <b>M81.5</b> - Osteoporose idiopática <b>M81.6</b> - Osteoporose localizada [Lequesne] <b>M81.8</b> - Outras osteoporoses <b>M82.0</b> - Osteoporose na mielomatose múltipla <b>M82.1</b> - Osteoporose em distúrbios endócrinos <b>M82.8</b> - Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte
198	1B	Pancreatina 10.000 UI (por cápsula).	- <a href="#">Insuficiência Pancreática Exócrina</a> ..(K86.0 – K86.1 – K90.3) - <a href="#">Fibrose Cística</a> . <a href="#">(Manifestações Pulmonares e Insuficiência Pancreática)</a> (E84.0 – E84.1 – E84.8)	<b>E84.1</b> - Fibrose cística com manifestações intestinais <b>E84.8</b> - Fibrose cística com outras manifestações <b>K86.0</b> - Pancreatite crônica induzida por álcool <b>K86.1</b> - Outras pancreatites crônicas <b>K90.3</b> - Esteatorréia pancreática
199	1B	Pancreatina 25.000 UI (por cápsula).	- <a href="#">Insuficiência Pancreática Exócrina</a> ..(K86.0 – K86.1 – K90.3) - <a href="#">Fibrose Cística</a> . <a href="#">(Manifestações Pulmonares e Insuficiência Pancreática)</a> (E84.1 – E84.8)	<b>E84.1</b> - Fibrose cística com manifestações intestinais <b>E84.8</b> - Fibrose cística com outras manifestações <b>K86.0</b> - Pancreatite crônica induzida por álcool <b>K86.1</b> - Outras pancreatites crônicas <b>K90.3</b> - Esteatorréia pancreática
200	1A	Paricalcitol 5,0 mcg/mL solução injetável (ampola com 1mL)	- <a href="#">Doença Renal Crônica - Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo e Estratégias de Atenuação</a> (N18.2 – N18.3 – N18.4 – N18.5 – N25.0 – E83.3)	<b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo <b>N18.2</b> – Doença renal crônico estágio 2 (suave) <b>N18.3</b> – Doença renal crônico estágio 3 (moderado) <b>N18.4</b> – Doença renal crônico estágio 4 (severo) <b>N18.5</b> – Doença renal crônico estágio 5 (dialise crônica) <b>N25.0</b> - Osteodistrofia renal
201	1B	Penicilamina 250 mg (por cápsula).	- <a href="#">Doença de Wilson</a> ..(E83.0)	<b>E83.0</b> - Distúrbios do metabolismo do cobre

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
202	2	Pilocarpina 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 10 ml).	- <a href="#">Glaucoma</a> ..(H40.1 – H40.2 – H40.3 – H40.4 H40.5 – H40.6 – H40.8 – Q15.0)	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito
203	Protocolo Estadual (RECOME)	Pirfenidona 267 mg (por cápsula)	- <a href="#">Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI)</a> (J84.1) <b>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás)</b> <b>O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</b>	J84.1 – Outras doenças pulmonares intersticiais com fibrose
204	2	Piridostigmina 60 mg (por comprimido).	- <a href="#">Miastenia Gravis</a> .(G70.0-G70.2)	<b>G70.0</b> – Miastenia Gravis <b>G70.2</b> - Miastenia congênita e do desenvolvimento
205	1A	Pramipexol 0,125 mg (por comprimido).	- <a href="#">Doença de Parkinson</a> . (G20)	<b>G20</b> – Doença de Parkinson
206	1A	Pramipexol 0,25 mg (por comprimido).	- <a href="#">Doença de Parkinson</a> . (G20)	<b>G20</b> – Doença de Parkinson
207	1A	Pramipexol 1 mg (por comprimido).	- <a href="#">Doença de Parkinson</a> . (G20)	<b>G20</b> – Doença de Parkinson
208	2	Primidona 100 mg (por comprimido)	- <a href="#">Epilepsia</a> .G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)	<b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de inc. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
209	2	Primidona 250 mg (por comprimido)	- <a href="#">Epilepsia</a> .G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal  <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples  <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas  <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas  <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas  <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais  <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)  <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal  <b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>
210	1A	Quetiapina 25 mg (por comprimido).	<p>- <a href="#">Esquizofrenia MS-GO</a> F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8)  - <a href="#">Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I</a> (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 - F31.5 – F31.6 – F31.7)  - <a href="#">Transtorno Esquizoafetivo</a>.(F25.0 – F25.1 – F25.2)</p>	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual  <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples  <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias  <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto  <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos  <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos  <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado  <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos  <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos  <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto  <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
211	1A	Quetiapina 100 mg (por comprimido).	<p><a href="#">-Esquizofrenia MS-GOF</a> F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8)</p> <p>- <a href="#">Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I</a> (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 - F31.5 – F31.6 – F31.7)</p> <p>- <a href="#">Transtorno Esquizoafetivo</a>.(F25.0 – F25.1 – F25.2)</p>	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual</p> <p><b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples</p> <p><b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias</p> <p><b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto</p> <p><b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado</p> <p><b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos</p> <p><b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto</p> <p><b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
212	1A	Quetiapina 200 mg (por comprimido).	<p><a href="#">-Esquizofrenia MS-GO</a> F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8 - )</p> <p>- <a href="#">Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I</a> (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 - F31.5 – F31.6 – F31.7)</p> <p>- <a href="#">Transtorno Esquizoafetivo.</a> (F25.0 – F25.1 – F25.2)</p>	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide  <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica  <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica  <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada  <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica  <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual  <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples  <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias  <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco  <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo  <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto  <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos  <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos  <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado  <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos  <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos  <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto  <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão</p>
213	1A	Quetiapina 300 mg (por comprimido).	<p><a href="#">-Esquizofrenia MS-GO</a> F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8 - )</p> <p>- <a href="#">Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I</a> (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 - F31.5 – F31.6 – F31.7)</p> <p>- <a href="#">Transtorno Esquizoafetivo.</a>(F25.0 – F25.1 – F25.2)</p>	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide  <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica  <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica  <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada  <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica  <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual  <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples  <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias  <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco  <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo  <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto  <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
				<p><b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos  <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado  <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos  <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos  <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto  <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão</p>
214		Ranibizumabe 10 mg/mL solução injetável (frasco-ampola)	<p>- <a href="#">Edema Macular secundário à retinopatia diabética (EMD)</a> (EMD) (H36.0)  - <a href="#">Edema Macular secundário à Oclusão Venosa da Retina (OVR)</a> (OVR) (H34.8)  - <a href="#">Degeneração Macular relacionada à Idade (DMRI) Neovascular</a> (H35.3)  <b>(Protocolos Clínicos do Estado de Goiás)</b>  <b>O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</b>  <b>Atenção:</b> Verificar nas Portarias Estaduais nº 03/2019-SES; nº 04/2019-SES e nº05/2019-SES como se dá o acesso e o fluxo de aplicação deste medicamento.</p>	<p><b>H 36.0</b> – Retinopatia Diabética  <b>H 34.8</b> – Outras oclusões vasculares retinianas  <b>H 35.3</b> – Degeneração da mácula e do polo posterior</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
215	2	Raloxifeno 60 mg (por comprimido).	- <a href="#">Osteoporose MS/GO</a> – ( M80.0 – M80.1 – M80.2 – M80.3 M80.4 – M80.5 – M80.8 – M80.9 - M81.0 - M81.1 – M81.2 – M81.3 – M81.4 M81.5 – M81.6 – M81.8 – M81.9 - M82.0 - M82.1 – M82.8 – M85.8)	<b>M80.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica <b>M80.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica <b>M80.2</b> - Osteoporose de desuso com fratura patológica <b>M80.3</b> - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica <b>M80.4</b> - Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica <b>M80.5</b> - Osteoporose idiopática com fratura patológica <b>M80.8</b> - Outras osteoporoses com fratura patológica <b>M81.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia <b>M81.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia <b>M81.2</b> - Osteoporose de desuso <b>M81.3</b> - Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica <b>M81.4</b> - Osteoporose induzida por drogas <b>M81.5</b> - Osteoporose idiopática <b>M81.6</b> - Osteoporose localizada [Lequesne] <b>M81.8</b> - Outras osteoporoses <b>M82.0</b> - Osteoporose na mielomatose múltipla <b>M82.1</b> - Osteoporose em distúrbios endócrinos <b>M82.8</b> - Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte <b>M85.8</b> - Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura óssea
216	1A	Rasagilina 1 mg (por comprimido)	- <a href="#">Doença de Parkinson</a> . (G20)	<b>G20</b> - Doença de Parkinson
217	1A	Riluzol 50 mg (por comprimido).	- <a href="#">Esclerose Lateral Amiotrófica</a> .G12.2)	<b>G12.2</b> – Doença do neurônio motor
218	Protocolo Estadual (RECOME)	Riociguate 0,5 mg (por comprimido revestido)	- <a href="#">Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica</a> (HPTEC) (I27.2)  <b>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás)</b> <b>O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</b>	<b>I27.2</b> – Outra hipertensão pulmonar secundária

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
219	Protocolo Estadual (RECOME)	Riociguat 1,0 mg (por comprimido revestido)	<p>- <a href="#">Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica</a> (HPTEC) (I27.2)  <b>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás)</b>  <b>O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</b></p>	I27.2 – Outra hipertensão pulmonar secundária
220	Protocolo Estadual (RECOME)	Riociguat 1,5 mg (por comprimido revestido)	<p>- <a href="#">Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica</a> (HPTEC) (I27.2)  <b>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás)</b>  <b>O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</b></p>	I27.2 – Outra hipertensão pulmonar secundária
221	Protocolo Estadual (RECOME)	Riociguat 2,0 mg (por comprimido revestido)	<p>- <a href="#">Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica</a> (HPTEC) (I27.2)  <b>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás)</b>  <b>O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</b></p>	I27.2 – Outra hipertensão pulmonar secundária
222	Protocolo Estadual (RECOME)	Riociguat 2,5 mg (por comprimido revestido)	<p>- <a href="#">Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica</a> (HPTEC) (I27.2)  <b>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás)</b>  <b>O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</b></p>	I27.2 – Outra hipertensão pulmonar secundária

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
223	1A	Risanquimabe 75mg / 0,83 mL (solução injetável)	- <a href="#">Psoríase</a> (L40.0 - L40.1 - L40.4 - L40.8)	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase
224	1A	Risdiplam 0,75mg/mL pó para solução oral (80mL)	- <a href="#">Atrofia Muscular Espinhal (AME) 5q tipos I e II</a> (G12.0 - G12.1)	<b>G12.0</b> - Atrofia muscular espinhal infantil tipo I (Werdnig-Hoffman) <b>G 12.1</b> - Outras atrofia muscular espinhal hereditárias
225	2	Risedronato 35 mg (por comprimido).	- <a href="#">Osteoporose MS/GO</a> - ( M80.0 - M80.1 - M80.2 - M80.3 M80.4 - M80.5 - M80.8 - M80.9 - M81.0 - M81.1 - M81.2 - M81.3 - M81.4 M81.5 - M81.6 - M81.8 - M81.9 - M82.0 - M82.1 - M82.8-M85.8)  - <a href="#">Doença de Paget - Osteíte deformante</a> (M88.0 - M88.8)	<b>M80.0</b> - Osteoporose e pós-menopáusia com fratura patológica <b>M80.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica <b>M80.2</b> - Osteoporose de desuso com fratura patológica <b>M80.3</b> - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica <b>M80.4</b> - Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica <b>M80.5</b> - Osteoporose idiopática com fratura patológica <b>M80.8</b> - Outras osteoporoses com fratura patológica <b>M81.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia <b>M81.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia <b>M81.2</b> - Osteoporose de desuso <b>M81.3</b> - Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica <b>M81.4</b> - Osteoporose induzida por drogas <b>M81.5</b> - Osteoporose idiopática <b>M81.6</b> - Osteoporose localizada [Lequesne] <b>M81.8</b> - Outras osteoporoses <b>M82.0</b> - Osteoporose na mielomatose múltipla <b>M82.1</b> - Osteoporose em distúrbios endócrinos <b>M82.8</b> - Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte <b>M88.0</b> - Doença de paget do crânio <b>M88.8</b> - Doença de paget de outros ossos <b>M85.8</b> - Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura óssea

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
226	1B	Risperidona 1 mg (por comprimido).	<p>- <a href="#">Autismo - Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo</a> (F84.0 – F84.1 – F84.3 – F84.5 F84.8)</p> <p>- <a href="#">Esquizofrenia MS-GO</a> (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8)</p> <p>- <a href="#">Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I</a> (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 - F31.5 – F31.6 – F31.7)</p> <p>- <a href="#">Transtorno Esquizoafetivo</a> (F25.0 – F25.1 – F25.2)</p>	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide  <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica  <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica  <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada  <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquifrênica  <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual  <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples  <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias  <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco  <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo  <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto  <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos  <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos  <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado  <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos  <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos  <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto  <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão  <b>F84.0</b> - Autismo infantil  <b>F84.1</b> - Autismo atípico  <b>F84.3</b> - Outro transtorno desintegrativo da infância  <b>F84.5</b> - Síndrome de asperger  <b>F84.8</b> - Outros transtornos globais do desenvolvimento</p>
227	1B	Risperidona 2 mg (por comprimido).	<p>- <a href="#">Autismo - Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro</a></p>	<p><b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide  <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <a href="#">Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo</a>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
			<p><a href="#">do Autismo</a> (F84.0 – F84.1 – F84.3 – F84.5 F84.8)</p> <p>-<a href="#">Esquizofrenia MS-GO</a> (F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8)</p> <p>- <a href="#">Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I</a> (F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 - F31.5 – F31.6 – F31.7)</p>	<p><b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica  <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada  <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica  <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual  <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples  <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias  <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco  <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo  <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto  <b>F31.1</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos  <b>F31.2</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos  <b>F31.3</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado  <b>F31.4</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos  <b>F31.5</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos  <b>F31.6</b> - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto  <b>F31.7</b> - Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão  <b>F84.0</b> - Autismo infantil  <b>F84.1</b> - Autismo atípico  <b>F84.3</b> - Outro transtorno desintegrativo da infância  <b>F84.5</b> - Síndrome de asperger  <b>F84.8</b> - Outros transtornos globais do desenvolvimento</p>
228	1B	Risperidona 1,0 mg/mL solução oral	<p>- <a href="#">Autismo - Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo</a> (F84.0 – F84.1 – F84.3 – F84.5 F84.8)</p>	<p><b>F84.0</b> - Autismo infantil  <b>F84.1</b> - Autismo atípico  <b>F84.3</b> - Outro transtorno desintegrativo da infância  <b>F84.5</b> - Síndrome de asperger  <b>F84.8</b> - Outros transtornos globais do desenvolvimento</p>
229	1A	Rituximabe 500 mg injetável (por frasco-ampola de 50 ml).	<p>- <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.1 –</p>	<p><b>M05.0</b> - Síndrome de Felty  <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
			M05.2 -M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8)	<b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas
230	1A	Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula).	- <a href="#">Doença de Alzheimer.</a> (F00.0- F00.1 – F00.2 – F00.9 - G30.0 – G30.1 – G30.8)	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer
231	1A	Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral ( por frasco de 120 ml). <b>Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica. (conforme painel de notificações da Anvisa)</b>	- <a href="#">Doença de Alzheimer.r</a> (F00.0- F00.1 – F00.2 – F00.9 - G30.0 – G30.1 – G30.8)	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer
232	1A	Rivastigmina 3 mg (por cápsula).	-- <a href="#">Doença de Alzheimer.</a> (F00.0- F00.1 – F00.2 – F00.9 - G30.0 – G30.1 – G30.8)	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
233	1A	Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula).	- <a href="#">Doença de Alzheimer</a> . (F00.0- F00.1 – F00.2 – F00.9 - G30.0 – G30.1 – G30.8)	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer
234	1A	Rivastigmina 6 mg (por cápsula).	- <a href="#">Doença de Alzheimer</a> . (F00.0- F00.1 – F00.2 – F00.9 - G30.0 – G30.1 – G30.8)	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista <b>F00.9</b> - Demência não especificada na doença de Alzheimer
235	1A	Rivastigmina adesivo transdérmico 9mg (5 cm <sup>2</sup> ) Percentual de liberação de 4,6mg/24 horas	- <a href="#">Doença de Alzheimer</a> . (F00.0- F00.1 – F00.2 – G30.0 – G30.1 – G30.8)	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista
236	1A	Rivastigmina adesivo transdérmico 18mg (10 cm <sup>2</sup> ) Percentual de liberação de 9,5mg/24 horas	- <a href="#">Doença de Alzheimer</a> . (F00.0- F00.1 – F00.2 – G30.0 – G30.1 – G30.8)	<b>G30.0</b> - Doença de alzheimer de início precoce <b>G30.1</b> - Doença de alzheimer de início tardio <b>G30.8</b> - Outras formas de doença de Alzheimer <b>F00.0</b> - Demência na doença de Alzheimer de início precoce <b>F00.1</b> - Demência na doença de Alzheimer de início tardio <b>F00.2</b> - Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista
237	1A	Romosozumabe 90mg/mL (seringa preenchida com 1,17 mL totalizando 105 mg)	- <a href="#">Osteoporose MS/GO</a> – ( M80.0 – M80.1 – M80.2 – M80.3 M80.4 – M80.5 – M80.8 - M81.0 - M81.1 – M81.2 – M81.3 – M81.4 M81.5 – M81.6 – M81.8 - M82.0 - M82.1 – M82.8)	<b>M 80</b> — Osteoporose com fratura patológica. <b>M 80.0</b> — Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica. <b>M 80.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica. <b>M 80.2</b> — Osteoporose de desuso com fratura patológica. <b>M 80.3</b> — Osteoporose por má absorção pós-cirúrgica com fratura patológica. <b>M 80.4</b> — Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica. <b>M 80.5</b> — Osteoporose idiopática com fratura patológica. <b>M 80.8</b> — Outras osteoporoses com fratura patológica. <b>M 81</b> — Osteoporose sem fratura patológica.

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
				<p><b>M 81.0</b> — Osteoporose pós-menopáusia.  <b>M 81.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia.  <b>M 81.2</b> — Osteoporose de desuso.  <b>M 81.3</b> — Osteoporose devida à má absorção pós-cirúrgica.  <b>M 81.4</b> — Osteoporose induzida por drogas.  <b>M 81.5</b> — Osteoporose idiopática.  <b>M 81.6</b> — Osteoporose localizada [Lequesne].  <b>M 81.8</b> — Outras osteoporoses.  <b>M 82</b> — Osteoporose em doenças classificadas em outras partes.  <b>M 82.0</b> — Osteoporose na mielomatose múltipla.  <b>M 82.1</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos.  <b>M 82.8</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos.</p>
238	1B	Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável (por frasco de 5 ml).	- <a href="#">Doença Renal Crônica - Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo e Estratégias de Atenuação</a> (N18.0 – N18.8)	<p><b>N18.0</b> - Doença renal em estágio final  <b>N18.8</b> - Outra insuficiência renal crônica</p>
239	1B	Sacubitril + Valsartana 50 mg (por comprimido)	<a href="#">Insuficiência Cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFEr)</a>	<p><b>I 50.0</b> — Insuficiência cardíaca congestiva.  <b>I 50.1</b> — Insuficiência ventricular esquerda.  <b>I 50.9</b> — Insuficiência cardíaca não especificada.</p>
240	1B	Sacubitril + Valsartana 100 mg (por comprimido)	<a href="#">Insuficiência Cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFEr)</a>	<p><b>I 50.0</b> — Insuficiência cardíaca congestiva.  <b>I 50.1</b> — Insuficiência ventricular esquerda.  <b>I 50.9</b> — Insuficiência cardíaca não especificada.</p>
241	1B	Sacubitril + Valsartana 200 mg (por comprimido)	<a href="#">Insuficiência Cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFEr)</a>	<p><b>I 50.0</b> — Insuficiência cardíaca congestiva.  <b>I 50.1</b> — Insuficiência ventricular esquerda.  <b>I 50.9</b> — Insuficiência cardíaca não especificada.</p>
242	Protocolo Estadual (RECOME)	Salmeterol 25 mcg + fluticasona 125 mcg (suspensão propelente).	<p>- <a href="#">Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO</a> (J44.0 – J44.1 – J44.8)</p> <p><b>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás)</b></p> <p><b>O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</b></p>	<p><b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior  <b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada  <b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
243	1A	Sapropterina (dicloridrato) 100 mg (por comprimido) <b>Produto destinado a mulheres em período periconcepcional ou gestando, conforme o PCDT vigente</b>	- <a href="#">Fenilcetonúria.</a> (E70.0 – E70.1)	<b>E70.0</b> - Fenilcetonúria clássica <b>E70.1</b> - Outras hiperfenilalaninemias
244	1A	Secuquinumabe 150 mg/mL (por seringa preenchida)	- <a href="#">Artrite Psorásica</a> (M07.0 –M07.2 - M07.3) - <a href="#">Espondilite Ancilosante.</a> (M45) - <a href="#">Espondilopatia Inflamatória</a> (M46.8) - <a href="#">Psoríase.</a> (L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8)	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M45</b> - Espondilite ancilosante <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas
245	1B	Selegilina 5 mg (por comprimido). <b>Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica (notificação feita na ANVISA/MS)</b>	- <a href="#">Doença de Parkinson.</a> (G20)	<b>G20</b> - Doença de Parkinson
246	1B	Selexipague 200 mcg comprimido	<a href="#">Hipertensão Arterial Pulmonar</a> ( I 27.0 – I 27.2 – I 27.8)	<b>I 27.0</b> — Hipertensão pulmonar primária <b>I 27.2</b> — Outra hipertensão pulmonar secundária (Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica – HPTEC) <b>I 27.8</b> — Outras doenças pulmonares do coração especificadas.
247	1B	Selexipague 400 mcg comprimido	<a href="#">Hipertensão Arterial Pulmonar</a> ( I 27.0 – I 27.2 – I 27.8)	<b>I 27.0</b> — Hipertensão pulmonar primária <b>I 27.2</b> — Outra hipertensão pulmonar secundária (Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica – HPTEC) <b>I 27.8</b> — Outras doenças pulmonares do coração especificadas.

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
248	1B	Selexipague 600 mcg comprimido	<a href="#">Hipertensão Arterial Pulmonar</a> ( I 27.0 – I 27.2 – I 27.8)	I 27.0 — Hipertensão pulmonar primária I 27.2 — Outra hipertensão pulmonar secundária (Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica – HPTEC) I 27.8 — Outras doenças pulmonares do coração especificadas.
249	1B	Selexipague 800 mcg comprimido	<a href="#">Hipertensão Arterial Pulmonar</a> ( I 27.0 – I 27.2 – I 27.8)	I 27.0 — Hipertensão pulmonar primária I 27.2 — Outra hipertensão pulmonar secundária (Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica – HPTEC) I 27.8 — Outras doenças pulmonares do coração especificadas.
250	1B	Selexipague 1000 mcg comprimido	<a href="#">Hipertensão Arterial Pulmonar</a> ( I 27.0 – I 27.2 – I 27.8)	I 27.0 — Hipertensão pulmonar primária I 27.2 — Outra hipertensão pulmonar secundária (Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica – HPTEC) I 27.8 — Outras doenças pulmonares do coração especificadas.
251	1B	Selexipague 1200 mcg comprimido	<a href="#">Hipertensão Arterial Pulmonar</a> ( I 27.0 – I 27.2 – I 27.8)	I 27.0 — Hipertensão pulmonar primária I 27.2 — Outra hipertensão pulmonar secundária (Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica – HPTEC) I 27.8 — Outras doenças pulmonares do coração especificadas.
252	1B	Selexipague 1400 mcg comprimido	- <a href="#">Hipertensão Arterial Pulmonar</a> ( I 27.0 – I 27.2 – I 27.8)	I 27.0 — Hipertensão pulmonar primária I 27.2 — Outra hipertensão pulmonar secundária (Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica – HPTEC) I 27.8 — Outras doenças pulmonares do coração especificadas.
253	1B	Selexipague 1600 mcg comprimido	- <a href="#">Hipertensão Arterial Pulmonar</a> ( I 27.0 – I 27.2 – I 27.8)	I 27.0 — Hipertensão pulmonar primária I 27.2 — Outra hipertensão pulmonar secundária (Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica – HPTEC) I 27.8 — Outras doenças pulmonares do coração especificadas.

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
254	1A	Sevelamer 800 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Raquitismo e Osteomalácia.</a> ( E83.3 )</li> <li>- <a href="#">Doença Renal Crônica - Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo e Estratégias de Atenuação</a> (N18.2 – N18.3 – N18.4 – N18.5 – N25.0 – E83.3)</li> </ul>	<p><b>N18.2</b> – Doença renal crônica estágio 2 (suave) <b>N18.3</b> – Doença renal crônica estágio 3 (moderado) <b>N18.4</b> – Doença renal crônica estágio 4 (severo) <b>N18.5</b> – Doença renal crônica estágio 5 (dialise crônica)</p> <p><b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo</p> <p><b>N18.0</b> - Doença renal em estágio final</p> <p><b>N25.0</b> - Osteodistrofia renal</p>
255	1A	Sildenafil 20 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Hipertensão Arterial Pulmonar.</a>(I27.0 – I27.2 – I27.8)</li> </ul>	<p><b>I27.0</b> - Hipertensão pulmonar primária</p> <p><b>I27.2</b> - Outra hipertensão pulmonar secundária</p> <p><b>I27.8</b> - Outras doenças pulmonares do coração especificadas</p>
256	1A	Sildenafil 25 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Esclerose Sistêmica.</a>M34.0 – M34.1 – M34.8)</li> </ul>	<p><b>M34.0</b> - Esclerose sistêmica progressiva</p> <p><b>M34.1</b> - Síndrome cr(e)st</p> <p><b>M34.8</b> - Outras formas de esclerose sistêmica</p>
257	1A	Sildenafil 50 mg (por comprimido).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Esclerose Sistêmica.</a>M34.0 – M34.1 – M34.8)</li> </ul>	<p><b>M34.0</b> - Esclerose sistêmica progressiva</p> <p><b>M34.1</b> - Síndrome cr(e)st</p> <p><b>M34.8</b> - Outras formas de esclerose sistêmica</p>
258	1A	Sirolimo 1 mg (por drágea).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Linfangioleiomiomatose – LAM</a> (J84.8)</li> <li>- <a href="#">Transplante Renal</a> (T86.1 – Z94.0)</li> <li>- <a href="#">Transplante Hepático.</a> (T86.4 – Z94.4)</li> </ul>	<p><b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim</p> <p><b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado</p> <p><b>J84.8</b> Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas</p> <p><b>Z94.0</b> - Rim transplantado</p> <p><b>Z94.4</b> - Fígado transplantado</p>
259	1A	Sirolimo 2 mg (por drágea).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Linfangioleiomiomatose – LAM-LAM</a> (J84.8)</li> <li>- <a href="#">Transplante Renal</a> (T86.1 – Z94.0)</li> <li>- <a href="#">Transplante Hepático.</a> (T86.4 – Z94.4)</li> </ul>	<p><b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim</p> <p><b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado</p> <p><b>J84.8</b> Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas</p> <p><b>Z94.0</b> - Rim transplantado</p> <p><b>Z94.4</b> - Fígado transplantado,</p>
260	1A	Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Deficiência de Hormônio do Crescimento – Hipopituitarismo.</a> (E23.0)</li> <li>- <a href="#">Síndrome de Turner.</a>(Q96.0 – Q96.1 – Q96.2 – Q96.3 Q96.4 – Q96.8)</li> </ul>	<p><b>E23.0</b> - Hipopituitarismo</p> <p><b>Q96.0</b> - Cariótipo 45, X</p> <p><b>Q96.1</b> - Cariótipo 46, X ISO (XQ)</p> <p><b>Q96.2</b> - Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ)</p> <p><b>Q96.3</b> - Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
			<p>- <a href="#">Transtorno do crescimento em criança nascida pequena para idade gestacional (PIG)</a> – (P05.0 – P05.1)</p>	<p><b>Q96.4</b> - Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal  <b>Q96.8</b> - Outras variantes da síndrome de turner  <b>P05.0</b> – Recém-nascido de baixo peso para a idade gestacional  <b>P05.1</b> – Pequeno para idade gestacional</p>
261	2	Sulfassalazina 500 mg (por comprimido).	<p>- <a href="#">Artrite Psoríase</a>.(M07.0 –M07.2 - M07.3)  - <a href="#">Artrite Reativa</a> (M02.1 - M02.3- M03.2 – M03.6)  - <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 - M08.1, M08.2, M08.3, M08.4 – M08.8 - M08.9)  - <a href="#">Artropatias Enteropáticas</a>.(M07.4 – M07.5 – M07.6)  - <a href="#">Doença de Crohn</a>. (K50.0 – K50.1 – K50.8)  - <a href="#">Espondilite Ancilosante</a>.(M45)  - <a href="#">Espondilopatia Inflamatória</a>.. (M46.8)  - <a href="#">Retocolite Ulcerativa</a>. (K51.0 – K51.1 – K51.2 – K51.3 – K51.4 - K51.5 – K51.8)</p>	<p><b>K50.0</b> - Doença de crohn do intestino delgado  <b>K50.1</b> - Doença de crohn do intestino grosso  <b>K50.8</b> - Outra forma de doença de crohn  <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica)  <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica)  <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica)  <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica)  <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon  <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa  <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas  <b>M02.1</b> - Artropatia pós-desintérica.  <b>M02.3</b> - Doença de Reiter  <b>M03.2</b> - Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte.  <b>M03.6</b> - Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte.  <b>M05.0</b> - Síndrome de Felty  <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão  <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide  <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas  <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas  <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa  <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas  <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal  <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica  <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas  <b>M07.4</b> - Artropatia na doença de Crohn [enterite regional]</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
				<p><b>M07.5</b> - Artropatia na colite ulcerativa  <b>M07.6</b> - Outras artropatias enteropáticas  <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil  <b>M08.1</b> – Espondilite Ancilosante juvenil  <b>M08.2</b> – Artrite juvenil com início sistêmico  <b>M08.3</b> - Poliartrite juvenil  <b>M08.4</b> - Artrite juvenil pauciarticular  <b>M08.8</b> – Outras artrites juvenis  <b>M08.9</b> – Artrite juvenil NE</p> <p><b>M45</b> - Espondilite ancilosante  <b>M46.8</b> - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas</p>
262	1A	Tacrolimo 1 mg (por cápsula).	<p>- <a href="#">Síndrome Nefrótica Primária (Adulto e Infantil)</a> (N04.0 – N04.1 – N04.2 – N04.3 N04.4 – N04.5 – N04.6 – N04.7 N04.8) – <b>exceto o CID: N04.9</b></p> <p>- <a href="#">Outros transplantes</a> (Transplante Hepático/T86.4 – Z94.4) (Transplante Cardíaco/ T86.2 – Z94.1)</p> <p>- <a href="#">Transplante Renal</a> T86.1 – Z94.0)</p>	<p><b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor <b>N04.1</b> - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares  <b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa <b>N04.3</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa  <b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa  <b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa  <b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso  <b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente  <b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica - outras</p> <p><b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim  <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração</p> <p><b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado  <b>Z94.0</b> - Rim transplantado <b>Z94.1</b> - Coração transplantado <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado</p>
263	1A	Tacrolimo 5 mg (por cápsula).	<p>- <a href="#">Síndrome Nefrótica Primária (Adulto e Infantil)</a> (N04.0 – N04.1 – N04.2 – N04.3 N04.4 – N04.5 – N04.6 – N04.7 N04.8)– <b>exceto o CID: N04.9</b></p>	<p><b>N04.0</b> - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor  <b>N04.1</b> - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares  <b>N04.2</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa  <b>N04.3</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa  <b>N04.4</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
			<p>- <a href="#">Outros transplantes</a> (Transplante Hepático/T86.4 – Z94.4 (Transplante Cardíaco/ T86.2 – Z94.1)</p> <p>-<a href="#">Transplante Renal</a> ( T86.1 – Z94.0)</p>	<p><b>N04.5</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa  <b>N04.6</b> - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso  <b>N04.7</b> - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente  <b>N04.8</b> - Síndrome nefrótica - outras  <b>T86.1</b> - Falência ou rejeição de transplante de rim  <b>T86.2</b> - Falência ou rejeição de transplante de coração    <b>T86.4</b> - Falência ou rejeição de transplante de fígado  <b>Z94.0</b> - Rim transplantado  <b>Z94.1</b> - Coração transplantado  <b>Z94.4</b> - Fígado transplantado</p>
264	1A	Tafamidis Meglumina 20 mg (por cápsula)	- E 85.1 – <a href="#">Polineuropatia Amiloidótica Familiar</a> (PAF)	E 85.1 – Amiloidose heredofamiliar neuropática
265	1A	Teriflunomida 14 mg (por comprimido)	G 35- <a href="#">Esclerose Múltipla</a> . (G35)	G35 - Esclerose múltipla
266	Protocolo Estadual (RECOME)	Teriparatida 250 mcg/mL seringa preenchida (subcutâneo)	<p>- <a href="#">Osteoporose MS/GO</a> – ( M80.0 – M80.1 – M80.2 – M80.3 M80.4 – M80.5 – M80.8 – M80.9 - M81.0 - M81.1 – M81.2 – M81.3 – M81.4 – M81.5 – M81.6 – M81.8 – M81.9 - M82.0 - M82.1 – M82.8)</p> <p><b>O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</b></p>	<p><b>M 80</b> — Osteoporose com fratura patológica.  <b>M 80.0</b> — Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica.  <b>M 80.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica.  <b>M 80.2</b> — Osteoporose de desuso com fratura patológica.  <b>M 80.3</b> — Osteoporose por má absorção pós-cirúrgica com fratura patológica.  <b>M 80.4</b> — Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica.  <b>M 80.5</b> — Osteoporose idiopática com fratura patológica.  <b>M 80.8</b> — Outras osteoporoses com fratura patológica.  <b>M 80.9</b> — Osteoporose não especificada com fratura patológica  <b>M 81</b> — Osteoporose sem fratura patológica.  <b>M 81.0</b> — Osteoporose pós-menopáusia.  <b>M 81.1</b> — Osteoporose pós-ooforectomia.  <b>M 81.2</b> — Osteoporose de desuso.  <b>M 81.3</b> — Osteoporose devida à má absorção pós-cirúrgica.  <b>M 81.4</b> — Osteoporose induzida por drogas  <b>M 81.5</b> — Osteoporose idiopática.  <b>M 81.6</b> — Osteoporose localizada [Lequesne].  <b>M 81.8</b> — Outras osteoporoses.  <b>M 81.9</b> — Osteoporose não especificada.  <b>M 82</b> — Osteoporose em doenças classificadas em outras parte.</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
				<b>M 82.0</b> — Osteoporose na mielomatose múltipla. <b>M 82.1</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos. <b>M 82.8</b> — Osteoporose em distúrbios endócrinos.
267	2	Timolol 5,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml).	- <a href="#">Glaucoma</a> ..(H40.1 – H40.2 – H40.3 – H40.4 H40.5 – H40.6 – H40.8 – Q15.0)	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito
268	1A	Tobramicina 300 mg / 5 mL solução inalatória (por ampola)	- <a href="#">Fibrose Cística</a> . ( <a href="#">Manifestações Pulmonares e Insuficiência Pancreática</a> ) (E84.0 – E84.8)	<b>E84.0</b> - Fibrose cística com manifestações pulmonares <b>E84.8</b> - Fibrose cística com outras manifestações
269	1A	Tocilizumabe 20 mg/ml injetável (por frasco ampola de 4 ml).	- <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> .(M05.0 – M05.3 – M05.8 – M06.0 M06.8 - M08.0) -	<b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil
270	1A	Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)	- <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.1 – M05.2- M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8) - <a href="#">Artrite Psoríase</a> (M07.0 – M07.2 - M07.3) <a href="#">Retocolite Ulcerativa</a> . (K51.0 – K51.2 – K51.3 K51.5 – K51.8)	<b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>223M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa / <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
271	1A	Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)	<p>- <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.1 – M05.2- M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8)</p> <p>- <a href="#">Artrite Psoríase</a> (M07.0 – M07.2 - M07.3)</p> <p>- <a href="#">Retocolite Ulcerativa</a>. (K51.0 – K51.2 – K51.3 K51.5 – K51.8)</p>	<p><b>M05.0</b> - Síndrome de Felty  <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão  <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide  <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas  <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas  <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa  <b>223M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas  <b>M07.0</b> - Artropatia psoriásica interfalangiana distal  <b>M07.3</b> - Outras artropatias psoriásicas  <b>M07.2</b> – Espondilite psoriásica  <b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica)  <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica)  <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica)  <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa  <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas</p>
272	2	Topiramato 25 mg (por comprimido).	<p>- <a href="#">Epilepsia</a>.G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)</p>	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal  <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples  <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas  <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas  <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas  <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais  <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)  <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal  <b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>
273	2	Topiramato 50 mg (por comprimido).	<p>- <a href="#">Epilepsia</a>.G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)</p>	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal  <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
				<p><b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas  <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas  <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas  <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais  <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)  <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal  <b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>
274	2	Topiramato 100 mg (por comprimido).	- <a href="#">Epilepsia</a> .(G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)	<p><b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises de iníc. focal  <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples  <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas  <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas  <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas  <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais  <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)  <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal  <b>G40.8</b> - Outras epilepsias</p>
275	1A	Toxina botulínica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola).	- <a href="#">Distonias Focais e Espasmo Hemifacial</a> . (G24.3 - G24.4 – G24.5 – G24.8 – G 51.3 – G51.8) - <a href="#">Espasticidade</a> . (G04.1 – G80.0 – G80.1 – G80.2 G81.1 – G82.1 – G82.4 – I69.0 - I69.1 – I69.2 – I69.3 – I69.4 – I69.8 – T90.5 – T90.8)	<p><b>G04.1</b> - Paraplegia espástica tropical  <b>G24.3</b> - Torcicolo espasmódico  <b>G24.4</b> - Distonia orofacial idiopática  <b>G245</b> - Blefaroespasma  <b>G24.8</b> - Outras distonias  <b>G51.3</b> – Espasmo Hemifacial clônico  <b>G51.8</b> - Outros transtornos do nervo facial  <b>G80.0</b> - Paralisia cerebral quadriplágica espástica  <b>G80.1</b> - Paralisia cerebral diplégica espástica  <b>G80.2</b> - Paralisia cerebral hemiplégica espástica  <b>G81.1</b> - Hemiplegia espástica</p>

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
				<b>G82.1</b> - Paraplegia espástica <b>G82.4</b> - Tetraplegia espástica <b>I69.0</b> - Seqüelas de hemorragia subaracnoídea <b>I69.1</b> - Seqüelas de hemorragia intracerebral <b>I69.2</b> - Seqüelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas <b>I69.3</b> - Seqüelas de infarto cerebral <b>I69.4</b> - Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico <b>I69.8</b> - Seqüelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas <b>T90.5</b> - Seqüelas de traumatismo intracraniano <b>T90.8</b> - Seqüelas de outros traumatismos especificados da cabeça
276	1A	Toxina botulínica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola).	- <a href="#">Distonias Focais e Espasmo Hemifacial</a> .(G24.3 - G24.4 – G24.5 – G24.8 – G 51.3 – G51.8) - <a href="#">Espasticidade</a> . (G04.1 – G80.0 – G80.1 – G80.2 G81.1 – G82.1 – G82.4 – I69.0 - I69.1 – I69.2 – I69.3 – I69.4 – I69.8 – T90.5 – T90.8)	<b>G04.1</b> - Paraplegia espástica tropical <b>G24.3</b> - Torcicolo espasmódico <b>G24.4</b> - Distonia orofacial idiopática <b>G245</b> - Blefaroespasmo <b>G24.8</b> - Outras distonias <b>G51.3</b> – Espasmo Hemifacial clônico <b>G51.8</b> - Outros transtornos do nervo facial <b>G80.0</b> - Paralisia cerebral quadriplágica espástica <b>G80.1</b> - Paralisia cerebral diplégica espástica <b>G80.2</b> - Paralisia cerebral hemiplégica espástica <b>G81.1</b> - Hemiplegia espástica <b>G82.1</b> - Paraplegia espástica <b>G82.4</b> - Tetraplegia espástica <b>I69.0</b> - Seqüelas de hemorragia subaracnoídea <b>I69.1</b> - Seqüelas de hemorragia intracerebral <b>I69.2</b> - Seqüelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas <b>I69.3</b> - Seqüelas de infarto cerebral <b>I69.4</b> - Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico <b>I69.8</b> - Seqüelas de outras doenças cerebrovasculares e das não

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
				especificadas <b>T90.5</b> - Seqüelas de traumatismo intracraniano <b>T90.8</b> - Seqüelas de outros traumatismos especificados da cabeça
277	1A	Travoprostá 0,04 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5 ml).	<a href="#">-Glaucoma.</a> H40.1 – H40.2 – H40.3 – H40.4 H40.5 – H40.6 – H40.8 – Q15.0)	<b>H40.1</b> - Glaucoma primário de ângulo aberto <b>H40.2</b> - Glaucoma primário de ângulo fechado <b>H40.3</b> - Glaucoma secundário a traumatismo ocular <b>H40.4</b> - Glaucoma secundário a inflamação ocular <b>H40.5</b> - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho <b>H40.6</b> - Glaucoma secundário a drogas <b>H40.8</b> - Outro glaucoma <b>Q15.0</b> - Glaucoma congênito
278	1A	Trientina 250 mg (por cápsula)	<a href="#">-Doença de Wilson.</a> (E83.0)	<b>E83.0</b> - Distúrbios do metabolismo do cobre
279	1B	Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)	- <a href="#">Endometriose</a> (N80.0 – N80.1 – N80.2 – N80.3 N80.4 – N80.5 – N80.8) - <a href="#">Leiomioma de Útero.</a> (D25.0 – D25.1 – D25.2) - <a href="#">Puberdade Precoce Central.</a> (E22.8)	<b>D25.0</b> - Leiomioma submucoso do útero <b>D25.1</b> - Leiomioma intramural do útero <b>D25.2</b> - Leiomioma subseroso do útero <b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise <b>N80.0</b> - Endometriose do útero <b>N80.1</b> - Endometriose do ovário <b>N80.2</b> - Endometriose da trompa de falópio <b>N80.3</b> - Endometriose do peritônio pélvico <b>N80.4</b> - Endometriose do septo retovaginal e da vagina <b>N80.5</b> - Endometriose do intestino <b>N80.8</b> - Outra endometriose
280	1B	Triptorrelina 22,5 mg Injetável (por frasco-ampola)	- <a href="#">Puberdade Precoce Central.</a> (E22.8)	<b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise
281	1A	Upadacitinibe 15 mg (por comprimido revestido de liberação prolongada)	- <a href="#">Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil</a> (M05.0 – M05.1 – M05.2- M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8)	<b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
				<b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soronegativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas
282	1A	Ustequinumabe 45 mg/0,5mL (frasco ampola)	- <a href="#">Psoríase</a> . (L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8)	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar <b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada <b>L40.4</b> - Psoríase gutata <b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase
283	Protocolo Estadual (RECOME)	Valganciclovir 450 mg (por comprimido)	<a href="#">-Profilaxia da doença por Citomegalovírus (CMV) em pacientes de alto risco submetidos a transplante renal</a> (Z94.0 – T86.1) <b>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás)</b> <b>O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</b>	<b>Z94.0</b> – Rim Transplantado <b>T86.1</b> – Falência ou rejeição de transplante de rim
284	1A	Vedolizumabe 300 mg solução injetável (pó liofilizado – frasco ampola)	- <a href="#">Retocolite Ulcerativa</a> . (K51.0 – K51.2 – K51.3 K51.5 – K51.8)	<b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas
285	2	Vigabatrina 500 mg (por comprimido).	- <a href="#">Epilepsia</a> ..(G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8)	<b>G40.0</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)/ crises de inic. focal <b>G40.1</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples <b>G40.2</b> - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas <b>G40.3</b> - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas <b>G40.4</b> - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas <b>G40.5</b> - Síndromes epilépticas especiais <b>G40.6</b> - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) <b>G40.7</b> - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal <b>G40.8</b> - Outras epilepsias

Nº	GRUPO	MEDICAMENTOS	DOENÇA/AGRAVO <b>Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)</b>	DETALHAMENTO DA SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)
286	1A	Ziprasidona 40 mg (por cápsula).	- <a href="#">Esquizofrenia</a> .(F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8) - <a href="#">Transtorno Esquizoafetivo</a> . (F25.0 – F25.1 – F25.2)	<b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto
287	1A	Ziprasidona 80 mg (por cápsula).	- <a href="#">Esquizofrenia</a> .F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8) - <a href="#">Transtorno Esquizoafetivo</a> . (F25.0 – F25.1 – F25.2)	<b>F20.0</b> - Esquizofrenia paranóide <b>F20.1</b> - Esquizofrenia hebefrênica <b>F20.2</b> - Esquizofrenia catatônica <b>F20.3</b> - Esquizofrenia indiferenciada <b>F20.4</b> - Depressão pós-esquizofrênica <b>F20.5</b> - Esquizofrenia residual <b>F20.6</b> - Esquizofrenia simples <b>F20.8</b> - Outras esquizofrenias <b>F25.0</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco <b>F25.1</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo <b>F25.2</b> - Transtorno esquizoafetivo do tipo misto

**Fontes: - Portaria GM/MS 1.554/2013 e suas atualizações.** (Título IV, do Anexo XXVIII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.)

**- Normas técnicas CGSI – SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS)**

**\* Grupo:**

A coluna “Grupo” se refere ao grupo de financiamento a que está enquadrado o medicamento, conforme as formas de organização do componente especializado da assistência farmacêutica:

- 1A: Aquisição e financiamento realizados pelo Ministério da Saúde.
- 1B: Aquisição realizada pelas Secretarias de Estados de cada Unidade Federada com financiamento pelo Ministério de Saúde.
- 2: Aquisição realizada pelas Secretarias de Estados de cada Unidade Federada com financiamento próprio.
- Protocolo Estadual: Aquisição realizada pela Secretarias de Estado da Saúde com financiamento próprio, conforme Relação Estadual Complementar de Medicamentos de Goiás.

